

بررسی پایایی مقیاس تعادلی برگ در ارزیابی تعادل کودکان

فلج مغزی اسپاستیک

تیمور عسگری^۱، دکتر محمد رضا هادیان^۲، دکتر نورالدین نخستین انصاری^۳، مهدی عبدالوهاب^۴، محمود جلیلی^۵، دکتر سقراط فقیه زاده^۶

چکیده

هدف: ارزیابی تعادل در بیماران نورولوژیک مقدم بر برنامه ریزی درمانی می باشد. با مرور بر اطلاعات تست های تعادلی مشاهده می شود که اکثر آنها برای بیماران برگ سال هنجاریابی شده اند و کمتر قابل استفاده در جمیعت کودکان می باشند. بنابراین دسترسی به مقیاسی پایا به منظور ارزیابی تعادل عملکردی در کودکان فلج مغزی ضروری می باشد. هدف این تحقیق بررسی پایایی اینترریتر و اینتراریتر مقیاس تعادلی برگ در ارزیابی تعادل کودکان فلح مغزی اسپاستیک می باشد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی که از نوع اعتبارسنجی می باشد، ۲۰ کودک مبتلا به فلح مغزی اسپاستیک با دامنه سنی ۶ تا ۱۲ سال و با میانگین سنی و انحراف معیار ($SD = 1/84$, $X = 7/35$)، با انتخاب غیر تصادفی در مطالعه شرکت نمودند. پس از کسب رضایت از والدین و آشنایی کودک با آزمون، ارزیابی اینترریتر در یک جلسه توسط آزمونگران بصورت تصادفی انجام و ارزیابی اینتراریتر، یک هفته بعد انجام شد. از آزمون ضریب همبستگی درون طبقه‌ای (ICC) جهت همبستگی بین نمرات دو آزمونگر استفاده شد.

یافته‌ها: با توجه به ضرایب همبستگی بدست آمده، توافق دو آزمونگر ($ICC = 0.985$, $P < 0.001$) و توافق در یک آزمونگر ($ICC = 0.994$, $P < 0.001$) عالی بود.

نتیجه گیری: مقیاس تعادلی برگ دارای پایایی اینترریتر و اینتراریتر بالا (High) برای اندازه گیری تعادل در کودکان مبتلا به فلح مغزی اسپاستیک می باشد. بنابراین به عنوان یک معیار کلینیکی پایا برای ارزیابی تعادل این کودکان پیشنهاد می شود.

کلید واژه‌ها: فلح مغزی / مقیاس تعادلی برگ / تست‌های پایایی / فلح دو طرفه اسپاسمی

این پژوهش تحت حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفته است.

- ۱- کارشناس ارشد کاردترمانی
- ۲- دکترای فیزیوتراپی، دانشیار دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۳- دکترای فیزیوتراپی، استادیار دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۴- کارشناس ارشد کاردترمانی، عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۵- دکترای آمار حیاتی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ دریافت مقاله: ۸۶/۱/۲۶

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۶/۵/۱۰

- * آدرس نویسنده مسئول:
تهران، خ انقلاب، پیج شمیران، جنب بهزیستی استان تهران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تلفن: ۷۷۵۳۶۱۳۴
- * E-Mail:hadianrs@sina.tums.ac.ir



مقدمه

خطر ناشی از تحقیق برای کودکانشان، رضایت نامه کتبی را برای شرکت کودکان در تست امضا نمودند. معیارهای اصلی ورود به مطالعه شامل موارد ذیل بود:

سن ۶ تا ۱۲ سال، ابتلا به فلج مغزی (نوع دای پلزی اسپاستیک)، قادر به ایستادن بدون استفاده از انواع وسایل کمکی. معیارهای خروج نیز شامل: داشتن مشکلات رفتاری، اختلال زبانی Receptive، اختلال توجه (Attention deficit)، اختلال شناختی و عقب‌ماندگی ذهنی، مشکلات بینایی و شنوایی (نایبنا و ناشنا) و انجام جراحی ارتوپدی در شش ماه گذشته بود.

پس از مراجعته بیمار به درمانگاه، بیمار به مدت ۱۵ دقیقه استراحت و با حفظ انجام تست و محیط درمانگاه آشنا می‌شد.

۵ دقیقه قبل از انجام تست، کودک با محیط کلینیک آشنا می‌پیدا کرده و در عین حال کیک و نوشیدنی داده شده را صرف می‌کردد. این مسئله موجب استانداردی که همه درمانگران بتوانند از آن استفاده کنند وجود ندارد. لذا بررسی پایابی مقیاس تعادلی مناسب کودکان که معتبر، قابل اطمینان، ساده، عملکردی و نشان‌دهنده توانایی‌های واقعی فرد در A.D.L باشد، از پیش نیازهای برنامه در کودکان فلح مغزی می‌باشد (۹، ۸، ۵).

در این تحقیق طی یک جلسه دو ساعته آموزش کامل و توضیحات لازم برای انجام موقوفیت آمیز تست به همکار آزمونگر داده شد. شایان ذکر است که نیوستید (۲۰۰۵) هم به آموزش صحیح و تجربه آزمونگر اشاره کرده است. آشنا می‌کودک با مراحل انجام تست فقط یکبار و به صورت کلامی و بینایی بوده است تا ضمن اطمینان از آشنا می‌کودک با مراحل تست مطمئن شویم که نمرات بدست آمده ناشی از یادگیری نبوده است (۱۰). این روش مشابه با مطالعه فرانچوین و همکاران در سال ۲۰۰۳ بود (۱۳). سپس برای ارزیابی تعادلی بین دو آزمونگر قرعه کشی شده تا نفر اول معین و برای بیماران بعدی، ترتیب آزمونگر به همین شکل تغییر می‌کرد. برای اجرای هر کدام از بخش‌های مقیاس تعادلی از راهنمایی‌های کلامی و بینایی استفاده شد. هر کودک براساس نحوه و کیفیت اجرای آزمون می‌توانست نمره صفر تا ۴ را به خود اختصاص دهد، بنابراین حد اکثر نمره‌ای که فرد می‌توانست در این آزمون بگیرد، ۵۶ بود.

پس از انجام مقیاس توسط آزمونگر اول، بیمار ۱۵ دقیقه استراحت کرده و آزمونگر دوم مقیاس را نجات می‌داد. در هنگام انجام مقیاس توسط آزمونگر اول، آزمونگر دوم حضور نداشت و شخص سومی فرمها را جمع آوری و نمره کل را محاسبه و ثبت نمود. به این ترتیب، آزمونگران از نتیجه نمره داده شده هم‌دیگر هیچ اطلاعی نداشتند.

فلج مغزی به صورت یک آسیب مغزی غیر پیش‌رونده ناشی از تکامل غیرطبیعی مغز و یا خدمات مغزی در زمان قبل، حین و یا پس از تولد است (۱، ۲). کودکان مبتلا به فلح مغزی اسپاستیک از لحاظ حرکتی و تعادل دارای مشکلات فراوانی می‌باشند. آمارها نشان می‌دهد که ۷۰ تا ۸۰ درصد فلح مغزی را نوع اسپاستیک تشکیل می‌دهند (۳، ۴). با توجه به این که تعادل در مرحله رشد قشری (Cortical) در کودکان ایجاد می‌شود، بنابراین در فلح مغزی اسپاستیک، اختلالات تعادلی نمود بیشتری پیدا می‌کند (۴، ۵، ۶) و باعث مشکلاتی در کارآئی عملکرد در حین فعالیتها می‌شود (۷). از این‌رو، ارزیابی تعادل در کودکان فلح مغزی قبل از هرگونه برنامه‌ریزی درمانی از ضروریات است (۸). روش‌های بررسی تعادل باید بتوانند با دقت کافی، عکس العمل‌های تعادلی کودکان فلح مغزی را در شرایط عملکردی ارزیابی کنند. در این رابطه، به نظر می‌آید مقیاس استانداردی که همه درمانگران بتوانند از آن استفاده کنند وجود ندارد. لذا بررسی پایابی مقیاس تعادلی مناسب کودکان که معتبر، قابل اطمینان، ساده، عملکردی و نشان‌دهنده توانایی‌های واقعی فرد در A.D.L باشد، از پیش نیازهای برنامه در کودکان فلح مغزی می‌باشد (۹، ۸، ۵).

بررسی پایابی مقیاس‌های تعادلی نشان می‌دهد که اکثر این مقیاس‌ها برای بیماران نورولوژیک سالم‌مند و یا مبتلا به پارکینسون، سکته و ضایعه مغزی بررسی شده‌اند و از این رو کمتر قابل استفاده در جمعیت کودکان می‌باشند (۱۰-۱۲). همانطور که ذکر شد مقیاس برگ^۱ کاملاً عملکردی بوده و به منظور بررسی تعادل افراد بزرگسال طراحی و در مطالعات مختلف پایابی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. مروری بر مطالعات نشان می‌دهد که تحقیقات بسیار محدودی در رابطه با ارزیابی مقیاس تعادلی برگ بر روی کودکان انجام شده است (۱۳، ۱۴) و فقط یک مورد مطالعه در فلح مغزی انجام شده است (۵). از این رو، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی پایابی اینترریتر و اینتراریتر مقیاس تعادلی برگ در کودکان فلح مغزی دای پلزیک اسپاستیک می‌باشد.

روش بررسی

این مطالعه توصیفی از نوع اعتبارسنجی بوده و توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران تصویب شده است. مطالعه حاضر با انتخاب غیرتصادفی و بر روی بیست کودک فلح مغزی اسپاستیک (دای پلزی) مراجعه کننده برای دریافت خدمات توان بخشی به درمانگاه دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. کودکان به تعداد مساوی از هر دو جنس دختر و پسر در مطالعه شرکت کردند. والدین پس از آشنایی کامل با نحوه کار و حصول اطمینان از عدم هرگونه



جدول ۲ - شاخصهای آماری نمرات آزمونگر اول در تکرار اول و دوم و نمرات آزمونگر دوم					
آمارهای توصیفی	نمرات	نمرات	نمرات	آزمونگر اول	آزمونگر دوم
BBS در جم نمونه			آزمونگر اول	آزمونگر دوم	آزمونگر اول
۳۸/۹۵	۳۸/۱۰	۳۹/۳۰	میانگین		
۱/۷۳	۱/۸۳	۱/۶۵	خطای معیار میانگین		
۷/۷۲	۸/۲۰	۷/۳۹	انحراف معیار		
۲۹-۴۹	۲۸-۵۰	۳۰-۴۹	دامنه		

جدول ۳ - پایایی ایترریتر مقیاس تعادلی برگ در گروه کودکان دای پلژی اسپاستیک					
مقدار	اختلاف دوتایی (CI)	ICC	میانگین	انحراف معیار	حد بالایی حد پایینی احتمال
<۰/۰۰۱	-۰/۹۶۲	-۰/۹۹۴	-۰/۹۸۵	۱/۶۵	۱/۱۰

جدول ۴ - پایایی ایترریتر مقیاس تعادلی برگ در گروه کودکان دای پلژی اسپاستیک					
مقدار	اختلاف دوتایی (CI)	ICC	میانگین	انحراف معیار	حد بالایی حد پایینی احتمال
<۰/۰۰۱	-۰/۹۸۶	-۰/۹۹۷	-۰/۹۹۴	۱/۰۴	۰/۴۰

بحث

نتایج این تحقیق نشان داد که در کودکان فلج مغزی اسپاستیک نوع دای پلژی، مقیاس تعادلی برگ دارای پایایی بالا بین نمرات دو آزمونگر (Interrater reliability) است. همچنین مشاهده شده که بین نمرات تکرار اول و دوم آزمونگر اول همبستگی معناداری وجود دارد که نشان دهنده پایایی ایترریتر بالا (High) در مقیاس تعادلی برگ می باشد.

همانطور که ذکر شد، در مطالعه حاضر پایایی ایترریتر مقیاس تعادلی برگ بالا (High) بود. نتایج تحقیق حاضر تواند از همانندگان مشابه با نتایج مطالعه فرانجوین و همکاران در سال ۲۰۰۳ می باشد. گرچه در این تحقیق دقیقاً به نوع فلج مغزی کودکان مورد مطالعه اشاره نشده است، ولی با این حال، تحقیق فوق از محدود مطالعات انجام شده در کودکان می باشد و از این رو، به مقایسه نتایج تحقیق حاضر و تحقیق مذکور پرداخته می شود. نتایج تحقیق فرانجوین و همکاران نشان داد که برای ارزیابی تعادل در کودکان با اختلال حرکتی کم تا متوسط در سینه مدرسه می توان از مقیاس تعادلی تغییر یافته برگ استفاده نمود و این مقیاس دارای پایایی ایترریتر وایترریتر (ICC=۰/۹۸) در گروه تحت مطالعه می باشد (۱۳).

1- Intraclass correlation coefficient

2- Confidence Interval of the difference

در مطالعه حاضر برای حذف نقش یادگیری بویژه در انجام مرحله test-retest یک هفته (۷ روز) فاصله رعایت شد. نتایج میانگین نمرات در تکرار اول و دوم در پژوهش حاضر نشان دهنده این مطلب است که فاصله یک هفته ای مناسب بوده و یادگیری کودک در انجام مجدد تست نقشی نداشته است. این روش با سایر تحقیقات انجام شده نیز همخوانی داشت (۱۰).

اطلاعات ثبت شده در جدول داده ها وارد نرم افزار اس.بی.اس.اس نسخه ۱۱/۵ شد و با استفاده از آزمون آماری^۱ ICC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این آزمون اختلاف بین نمرات دو آزمونگر و تکرار در یک آزمونگر را بررسی می کند و معنادار بودن یا نبودن آن را نشان می دهد که در حقیقت به معنی بررسی پایایی آزمون برگ می باشد.

یافته ها

چنانچه در جدول ۱ نشان داده شده است، میانگین سن کودکان ۷/۳۵ سال، میانگین قد آنها ۱۱۶/۴۰ سانتی مترو و میانگین وزنشان ۲۱/۲۰ کیلوگرم بوده است، توضیحات کاملتر درباره محدوده و انحراف معیار شاخصهای ذکر شده در جدول (۱) بیان شده است.

متغیرهای دموگرافیک	انحراف معیار	خطای معیار	میانگین معیار	دامنه	سن (سال)
قد (سانتی متر)	۱۲/۷۸	۱۱۷/۴۰	۱۰۳-۱۴۵		
وزن (کیلوگرم)	۷/۰۸	۲۱/۲۰	۱۲-۳۸		
مدت گذشته از ضایعه (ماه)	۲۲/۵۰	۸/۶/۴۰	۶۶-۱۴۴		

با توجه به جدول (۲) ملاحظه می شود که میانگین نمرات و انحراف معیار آزمونگر اول و دوم به ترتیب به ۰/۹۸۴ و ۰/۹۳۹ و ۳۹/۳۰±۷/۳۹ و ۳۸/۱۰±۸/۲۰ می باشد. همچنین میانگین و انحراف معیار نمرات آزمونگر اول یک هفته بعد (ایترریتر)، ۳۸/۹۵±۷/۷۲ می باشد.

جدول (۳) اطلاعات مربوط به پایایی ایترریتر (تکرار در بین دو آزمونگر) مقیاس تعادلی برگ را نشان می دهد. با توجه به مقادیر بدست آمده در جدول فوق، بین نمرات دو آزمونگر همبستگی عالی (High) وجود دارد. جدول فوق، بین نمرات دو آزمونگر همبستگی عالی (High) وجود دارد. $CI = 0/95 \pm 0/001$ ، $P < 0/994$ ، $ICC = 0/985$ ، $CI = 0/962 - 0/997$ ، $CI = 0/95 \pm 0/001$. حد بالا و پایین (فاصله اطمینان) ۹۵٪ می باشد.

با توجه به جدول شماره (۴) مشاهده می شود که بین نمرات تکرار اول و دو آزمونگر اول همبستگی عالی (High) وجود دارد. $CI = 0/994 - 0/986$ ، $P < 0/001$ ، $ICC = 0/994$.



نگردیده است.

نتیجه گیری

مقیاس تعادلی برگ دارای پایابی اینترریتر و اینتراریتر بالا (High) برای اندازه گیری تعادل در کودکان فلچ مغزی نوع دای پلژی اسپاستیک می باشد و می توان از آن به عنوان یک معیار کلینیکی پایاد رازیابی کودکان فلچ مغزی (دای پلژی) استفاده نمود. پیشنهاد می شود که مقیاس تعادلی برگ جهت ارزیابی توانایی های عملکردی در زندگی روزمره کودکان استفاده شود. با توجه به نتایج این تحقیق و از آنجایی که مقیاس تعادلی برگ یک مقیاس با کاربرد آسان در کلینیک می باشد و انجام آن تنها ۱۵ دقیقه زمان نیاز دارد، لذا انجام تحقیقات بیشتر در زمینه پایابی مقیاس در سایر گروه های فلچ مغزی پیشنهاد می شود. پیشنهاد می شود که تحقیقات بیشتری در زمینه اثر تجربه کلینیکی کاربایماران فلچ مغزی و همچنین آشنایی و سابقه استفاده از مقیاس تعادلی برگ در آزمون نگر بر روی پایابی این مقیاس انجام گیرد.

تشکر و قدردانی

انجام این پژوهه با استفاده از بودجه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران میسر گردید. نویسندها بین وسیله های مراتب قدردانی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت پژوهشی این دانشگاه اعلام می دارند.

همانطور که ذکر شد نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایابی اینتراریتر مقیاس تعادلی برگ نیز بالا (High) بود. این نتیجه مشابه با آن دسته از تحقيقات می باشد که عمدتاً از مقیاس تعادلی برگ برای ارزیابی میزان تعادل بزرگسالان استفاده شده است. اگر چه گروه تحت مطالعه در این تحقيقات (بزرگسالان) با گروه تحت مطالعه پژوهش حاضر (کودکان فلچ مغزی) تطبيق ندارد، ولی با این حال، مقایسه این دو دسته از تحقيقات، با توجه به یکسان بودن پایابی اینتراریتر مقیاس تعادلی برگ در آنها می تواند مفید می باشد. همانطور که ذکر شد نتایج تحقيقات قطب الدین و همکاران (۱۵) در بزرگسالان مبتلا به پارکینسون، مکنزی (۱۶) در بزرگسالان مبتلا به سکته مغزی (ICC=۰/۹۸) و جورجتی (۱۷) در افراد سالمند (ICC=۰/۹۸) و مطالعه نیوستید (۱۰) بر روی افراد بزرگسال دچار ضایعه مغزی (ICC=۰/۹۸۶) نیز نشان داد که مقیاس تعادلی برگ دارای پایابی اینتراریتر بالا بوده است.

اگر چه مطالعه نیوستید در سال (۲۰۰۵) نشان داد که وجود تجربه کلینیکی کار با فلچ مغزی و آشنایی و استفاده قبلی از مقیاس در آزمون نگر، بر روی نتایج ناشی از ارزیابی پایابی مقیاس تعادلی برگ مؤثر می باشد (۱۰)، ولی در مطالعه حاضر علیرغم اینکه همکاران آزمون نگر آشنایی قبلی با تست نداشتند و تجربه کلینیکی کمتری نسبت به محققین داشتند، نتیجه پایابی بالا بود. این تفاوت می تواند ناشی از آموزش مناسب همکاران جوان انجام دهنده آزمون باشد که شاید در تحقيقات مشابه بخوبی رعایت

منابع:

- 1- Behrman PF, Kliegman RM. Nelson essential of Pediatrics. 4th ed. Philadelphia WB, Saunders:2002;50-52.
- 2- Christos P, Basil P. Encyclopedia of pediatric neurology. Theory and practice.2nd ed. 1999;322-355.
- 3- Kerr H, Graham P. Musculoskeletal aspects of cerebral palsy. Journal of bone and joint surgery Mar 2003; 85(2): 157
- 4- Standley F, Blair E, Alberman E. Cerebral palsy: Epidemiology and causal pathways. Clinician developmental medicine 2000;151
- 5- Kembhavi G, Darrah J, Magill E, joan M. Pediatr. phys. Ther 2002; 92 - 99
- 6- Hayes M, Ewen IR, Lovett D, et al. Survey of pediatric physical therapists , educational needs and perceptions of motor control , Motor development and Motor Learning as they relate to services for children with developmental disabilities. pediatric physical Therapy 1999; 164-182
- 7- Bell KJ, Ounpuu S, Deluca PA, Romness MJ. Natural progression of gait in children with cerebral palsy. Journal pediatr. Orthop. 2002; 22: 677 - 82
- 8- Difabio RP, Seay R, Use of Fast evaluation of mobility, Balance and Fear in elderly community dwellers: Validity and Reliability. physical therapy 1997; (77): 904 - 915
- 9- Zwick D, Rochelle A, Choksi A, Domowicz y. Evaluation and treatment of balance in the elderly. Journa of Neuro rehabilitation 2000; 15: 40-56
- 10- Newstead A, Martha R, Tomberlin JA. Reliability of the Berg Balance Scale and
- Balance Master limits of Stability. Journal of Neurologic physical Therapy Mar 2005; 29 (1): 18 - 19
- 11- Piotrowski A, Cole J. Clinical Measures of Balance and Function Assessment in Elderly persons. Australian Physiotherapy 1994; 40: 183-188
- 12- Harada N, Chiu V, Rodriguez JD, Fowler E, Siu A, Reuben D.B. Screening for Balance and Mobility Impairment in Elderly individuals living in Residential Care Facilities. Physical Therapy 1999; (75): 462 - 469
- 13- Franjoine M, Joan S, Taylor M. Pediatric Balance Scale: A modified version of the Berg balance scale for the school-age child with mild to moderate motor impairment; Journal of pediatr. Phys. Ther 2003; (2):114 - 128
- ۱۴- باقی، ش. بررسی پایابی و روابط مقیاس تعادلی Berg بر کودکان سالم تا ۱۱ ساله شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران . دانشکده توانبخشی ۱۲۸۳
- 15- Qutubuddin A, Phillip O, David X, Brown R, Mcnamee S, Carne W. Validating the Berg Balanse Scale for patient with Parkinson's disease: akey to rehabilitation evaluation. Arch Phys Med rehabil Vol 86, April 2005.
- 16- Mackenzi M. A simplified measure of balance by functional reach. Physiotherapy research international: Proquest Nursing Journals. Pg.233; 1994.
- 17- Giorgetti MM, Harris BA, Jette A. Reliability of clinical balance outcome measures in the elderly. Physiotherapy research international: Proquest Nursing Journals. Pg.274; 1998.