

بررسی تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی بر فشار خون سالمدان

مبلا به هیپرتانسیون اولیه ساکن در مرکز سالمدان کهریزک

چکیده

هدف: هیپرتانسیون یکی از بیماریهای مزمن می باشد که از نظر هزینه درمانی و مراقبتی رقم بالای را به خود اختصاص می دهد. با توجه به مزایای روش‌های غیر دارویی موثر بر فشار خون پژوهشگر انجام تحقیق حاضر را ضروری دانسته تا تاثیر برنامه آرامسازی پیشرونده عضلانی را روی فشار خون سالمدان مبتلا به هیپرتانسیون اولیه مورد بررسی قرار دهد.

روش بررسی: این پژوهش یک پژوهش نیمه تجربی بوده که در دو گروه آزمون و شاهد به منظور بررسی تاثیر تکنیک آرامسازی پیشرونده عضلانی بر فشار خون سالمدان مبتلا به هیپرتانسیون اولیه ساکن در مرکز سالمدان کهریزک در سال ۱۳۸۳ صورت گرفته است. تعداد ۵۵ نفر سالمند هیپرتانسیونی (۲۷ نفر گروه آزمون و ۲۸ نفر گروه شاهد) به روش نمونه گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، چک لیست ثبت فشارخون و تعداد ضربان نبض و دستگاه فشارسنج و گوشی پزشکی بوده است. برای گروه آزمون تکنیک آرامسازی به مدت شش هفته، هفت‌های سه روز، در طی جلسات ۲۰ دقیقه‌ای اجرا شده و میزان فشار خون افراد در هر بار پس از اجرای مداخله مورد بررسی قرار می‌گرفت و در پایان با گروه شاهد مقایسه گردیدند. تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم افزار آماری spss صورت پذیرفت.

یافته‌ها: آزمون آماری من-ویتنی نشان داد فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله اختلاف معنی داری با هم نداشتند ($P > 0.05$). همین آزمون بین میانگین‌های فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در دو گروه پس از مداخله اختلاف معنی داری را نشان می‌دهد ($P < 0.05$) و آزمون آماری ویلکاکسون اختلاف معنی داری بین قبل از مداخله و بعد از مداخله از نظر کاهش فشارخون و تاثیر برنامه مداخله در گروه آزمون نشان می‌دهد ($P < 0.05$).
نتیجه‌گیری: نتایج نهایی پژوهش نشان می‌دهند که فشار خون سیستول و دیاستول در گروه آزمون کاهش یافته است. با توجه به این نتایج می‌توان گفت که فرضیه پژوهش تحت عنوان «تکنیک آرامسازی باعث کاهش فشارخون در افرادی می‌شود که این تکنیک را تمرین می‌کنند» مورد تایید قرار می‌گیرد.

کلید واژگان: پرسشاری خون / آرامسازی / سالمند / کهریزک

سعید حمیدی زاده

کارشناس ارشد آموزش پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس

*دکتر فضل الله احمدی

دکترای آموزش پرستاری،
استادیار گروه پرستاری دانشگاه
تربیت مدرس

دکتر مسعود فلاحتی

دکترای پرستاری، استادیار دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی

*E-mail: fazlollah@yahoo.com



تحقیقات متعددی خاطر نشان می کنند که تا حد ممکن در درمان بیماریهای دوران سالم‌مندی از روش‌های غیر دارویی استفاده شود و یا حتی امکان از این روش‌ها به همراه داروها استفاده شود(۱۷) تا نیاز به مصرف داروها کمتر شود و در نتیجه فرد سالم‌مند دچار عوارض ناخواسته دارویی نگردد و تداخلات دارویی در آنان کاهش یابد(۱۸). تکنیک آرامسازی پیش‌روندۀ عضلانی (P.M.R) باعث ایجاد تعادل بین فعالیت هیپوتالاموس خلفی (مسئول تحریک سپاتیک) و هیپوتالاموس قدامی (تحریک پاراسمپاتیک) می‌شود و در نتیجه از افزایش فشار خون جلوگیری می‌کند و آن را کاهش می‌دهد(۱۹). آرامسازی پیش‌روندۀ عضلانی از جمله روش‌های غیر دارویی مقابله با پرفشاری خون می‌باشد که از تئوری روانی - عصبی - ایمونولوژیکی تبعیت می‌کند. این تئوری مطالعه تعامل چند گانه فرایند انطباق بین رفتار، نورواندوکرین و ایمونولوژی است. به عبارت دیگر تئوری سایکونروایمونولوژی به حوزه‌ای از دانش اطلاق می‌شود که به بیان ارتباط عوامل عصبی شناختی، روان شناختی و اینمنی شناختی با بیماریهای مختلف جسمانی می‌پردازد. با توجه به حوزه این دانش می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از این روش به عنوان چهارچوبی در برنامه درمانی و مراقبتی کمک می‌کند(۲۰) لذا با توجه به موارد فوق الذکر پژوهشگرانجام تحقیق حاضر را ضروری دانسته تا تاثیر و کارآمدی برنامه آرامسازی پیش‌روندۀ عضلانی را روی فشار خون سالم‌مندان مبتلا به هیپرتانسیون اولیه مورد بررسی قرار دهد.

روش بررسی

پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی بوده که در آن برنامه آرامسازی پیش‌روندۀ عضلانی برای تمامی افراد گروه آزمون اجرا شده ولی برای گروه شاهد این برنامه اجرانگردید و تنها برای مقایسه با گروه آزمون مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌های پژوهشی بیماران هیپرتانسیونی در گروه یک و دو بوده که با توجه به ویژگیهای مورد نظر برای واحدهای پژوهشی به صورت تصادفی از جامعه پژوهش انتخاب شدند. تعداد نمونه‌های پژوهشی در ابتدای تحقیق ۶۱ نفر بودند که ۳۱ نفر در گروه آزمون و ۳۰ نفر در گروه شاهد بودند و ۴ نفر از نمونه‌ها در گروه آزمون و ۲ نفر از نمونه‌ها در گروه شاهد تا پایان تحقیق همکاری نداشتند و از پژوهش حذف گردیدند و در نهایت ۵۵ نفر از افراد مورد پژوهش قرار گرفته است. افراد پژوهش همگی سالم‌مند، دارای پرفشاری خون درجه یک و دو و ساکن در مرکز سالم‌مندان که ریزک بودند. ابزار گرد آوری داده‌ها در این پژوهش شامل فرم مشخصات دمو گرافیک و بیماری فرد، چک لیست ثبت فشار خون و

مقدمه

هیپرتانسیون (Hypertension) یکی از بیماریهای مزمن می‌باشد(۱) که از نظر هزینه درمانی و مراقبتی رقم بالای را به خود اختصاص می‌دهد و شایع‌ترین بیماری قلبی - عروقی می‌باشد(۲).

هیپرتانسیون عامل ۱۴۷ هزار مورد مرگ در سکته مغزی و ۴۲ هزار مورد مرگ در نارسایی احتقانی قلب "Congestive Heart Failure" (CHF) (۳) ۴۹۸ هزار مورد مرگ در بیماری عروق کرونر (CAD) (۴) Artery Disease و ۲۳ هزار مورد مرگ در بیماریهای کلیوی در سال ۲۰۰۳ در ایالات متحده آمریکا بوده است(۳ و ۴) به علت شیوع بالای (بیش از ۶۰ درصد در افراد بالای ۶۵ سال در ایالات متحده آمریکا) این بیماری (۵) و افزایش خطر بیماری‌های قلبی - عروقی ناشی از آن یک مشکل عمده بهداشتی در تمام جهان و بخصوص در جوامع صنعتی می‌باشد(۶).

طبق تحقیقی که در سال ۱۳۸۳ در شهر اصفهان صورت پذیرفت، شیوع پرفشاری خون در سالم‌مندان شهر اصفهان ۶۴/۸ درصد برآورد گردیده که درصد غیر قابل انتظار بالای بوده است(۷). نزدیک به ۶۵ درصد از جمعیت گروه سنی ۷۴-۶۵ ساله را در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۹، پرفشاری خون به خود دچار کرده است(۸)، در کشور ما ایران نیز طبق بررسی انجام شده در سال ۱۳۷۷، ۳۵ درصد از مردان بالای ۶۵ سال و ۴۵ درصد از زنان بالای ۶۵ سال به پرفشاری خون مبتلا می‌باشند(۹) و همچنین طی تحقیقی که در سال ۱۳۷۳ در آسایشگاه سالم‌مندان شهر تهران صورت پذیرفته است، شایع‌ترین مشکل قلبی و عروقی را با شیوع ۵۰٪، هیپرتانسیون شامل می‌شود(۱۰).

علی‌رغم اینکه به طور طبیعی با افزایش سن میزان فشار خون نیز بالا می‌رود(۱۱) ولی تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که این رابطه یک سیر بیولوژیک حتمی نمی‌باشد و می‌تواند از نحوه زندگی و کیفیت زندگی افراد تاثیر بپذیرد(۱۲). با توجه به افزایش رشد جمعیت سالم‌مندان و با توجه به مشکلات زیادی که سالم‌مندان در زمینه‌های مختلف زندگی از جمله بیماریهای مزمن (مانند پرفشاری خون)، روانی و... دارند، افزایش احتیاج به مراقبت را در برخواهد داشت(۱۳). درمان هیپرتانسیون در افراد بالای ۶۵ سال همان اثری را دارد که روی افراد جوان دارد(۱۴) یعنی می‌تواند عوارض ناشی از آن را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد(۱۵) طی یک تحقیق متا آنالیزی که در سال ۱۹۹۹ در کشور آمریکا انجام گرفته، نشان داده شده است که کاهش ۵-۶ میلی متر جیوه در فشار خون دیاستول می‌تواند تا ۴۲ درصد خطر شوک و تا ۱۴ درصد خطر بیماری‌های قلبی را کاهش دهد(۱۶).



در گروه آزمون ۱ نفر از افراد به دلیل افزایش شدید فشار خون، ۲ نفر به دلیل ترک آسایشگاه و یک نفر به دلیل عدم تمایل به ادامه همکاری از تحقیق حذف شدند. در گروه شاهد نیز ۲ نفر از افراد به دلیل افزایش فشار خون در آنان از پژوهش حذف گردیدند.

یافته‌ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری spss استفاده گردید. یافته‌های حاصل از بررسی اطلاعات دموگرافیک درین پژوهش نشان می‌دهند که اکثریت افراد در گروه آزمون و شاهد از نظر وضعیت تأهل همسر مرد‌هاند، از نظر میزان تحصیلات اکثریت در هر دو گروه یا بی‌سواند و یا دارای تحصیلات ابتدایی بوده‌اند، بعلاوه نتایج نشان می‌دهند که میانگین مدت زمان اقامت در خانه سالمندان در گروه آزمون و شاهد به ترتیب ۲/۵۹ سال و ۲/۵۰ سال می‌باشد. اکثریت افراد در هر دو گروه آزمون و شاهد از نظر شغل سابق یا کارمند و یا خانه دار بوده‌اند، از نظر وضعیت اقتصادی، در هر دو گروه بیشتر افراد دارای وضعیت اقتصادی ضعیف بودند، بیشترین تعداد افراد در هر دو گروه از نظر شاخص تردد بدنی لیتمن استفاده شد که از همین گوشی به صورت ثابت قبل و کیلوگرم بر متر مربع بوده‌اند. در هر دو گروه تعداد بیشتر افراد بیماری هیپرتانسیون در آنان تاکنون تشخیص داده نشده بود. از نظر مصرف سیگار، در هر دو گروه، اکثریت افراد سابقه استعمال سیگار را داشتند. آزمون آماری کای-دو ارتباط آماری معنی داری بین متغیرهای اثرگذار فوق الذکر و میزان فشار خون نشان نداده است ($p < 0.05$).

نتایج حاصل از مداخله بر میزان فشار خون در دو مرحله قبل و بعد از اتمام مداخله در دو گروه آزمون و شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمون آماری من-ویتنی بین میانگین فشار خون سیستولیک در دو گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله تفاوت معنی داری را نشان نمی‌دهد ($P = 0.23$) ولی همین آزمون بین میانگین فشار خون سیستولیک در دو گروه شاهد و آزمون در پس از مداخله بصورت معنی داری اختلاف نشان می‌دهد ($P = 0.00$) به طوری که در گروه آزمون فشار خون بعد از اتمام مداخله کاهش یافته است و آزمون آماری ویلکاکسون بین قبل و بعد از مداخله از نظر کاهش میزان فشار خون سیستولیک اختلاف معنی داری را نشان می‌دهد ($P = 0.00$).

تعداد ضربان نبض قبل از مداخله و هر بار بعد از مداخله، متن آرامسازی پیشرونده عضلانی، دستگاه فشار سنج جیوه‌ای و گوشی پزشکی بوده است. در فرم مشخصات دموگرافیک و بیماری فرد معیارهای قد، وزن، سن، جنس، میزان تحصیلات، مدت ابتلاء به هیپرتانسیون، شغل سابق، نوع داروی مصرفی، مدت زمان اقامت در خانه سالمندان و وضعیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین روابی پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و بیماری فرد از روش اعتبار محتوی استفاده گردید و همچنین برای تعیین پایابی این ابزار از آزمون مجدد استفاده گردید که با آزمون ضریب همبستگی پیرسون با $r = 0.89$ پایابی این ابزار تایید گردید. برای تعیین روابی چک لیست ثبت مشاهدات نیز از روش اعتبار محتوی استفاده شد، برای تعیین پایابی آن بدین ترتیب عمل شد که پژوهشگر و یک نفر که از نظر ویژگیهای علمی و تخصصی به وی نزدیک بود اقدام به ثبت مشاهدات به صورت جداگانه نمودند و ضریب همبستگی بین دو بار اندازه گیری توسط دو فرد متفاوت، سنجیده شد که با $r = 0.90$ پایابی ثبت مشاهدات مورد تایید قرار گفت. جهت انتخاب گوشی پزشکی پس از مشورت با متخصصین از گوشی پزشکی استاندارد با مارک لیتمن استفاده شد که از همین گوشی به صورت ثابت قبل و حین مداخله استفاده گردید. متن آرامسازی پیشرونده عضلانی، متن استاندارد روش لازاروس بوده که در بسیاری از تحقیقات از آن استفاده شده و استاندارد بودن آن مورد تایید می‌باشد. پس از تعیین پایابی ابزارهای پژوهش و اتمام نمونه گیری بر اساس ویژگیهای مورد نظر پژوهش، برای گروه شاهد در جلسه ای ۲۰ دقیقه‌ای در مورد مراحل تحقیق و مدت زمان انجام تحقیق (۶ هفته) و اینکه سه بار در هفته در ساعت معینی از روز فشار خون و نبض آنان اندازه گیری می‌شود، توضیحات لازم داده شد و رضایت آنان جلب گردید و پس از آن هر هفته، هفته‌ای سه روز، در ساعت معینی از روز فشار خون و نبض آنان مورد اندازه گیری قرار گرفت و در چک لیست مورد ثبت قرار گرفت تا در پایان با گروه آزمون مورد مقایسه قرار گیرند. در گروه آزمون نیز پس از اتمام نمونه گیری توضیح ۳۰ دقیقه‌ای در مورد مراحل و چگونگی تحقیق داده شد و رضایت آنان جلب گردید و در همان جلسه فرم مشخصات دموگرافیک و بیماری فرد تکمیل شد و پس از این مرحله، پژوهشگر هر هفته (سه روز) و در طی ۶ هفته در ساعت معینی از روز جهت انجام تکنیک در محلی مناسب فارغ از حرکات محیطی اقدام به انجام دادن روی نمونه‌های گروه آزمون می‌نمود. مدت زمان انجام تکنیک ۲۰ دقیقه بوده و در گروههای ۵ - ۳ نفره انجام می‌گرفت، و هر بار پس از انجام دادن تکنیک، فشار خون و نبض افراد اندازه گیری می‌شد.



جدول شماره ۱) مقایسه میانگین فشار خون سیستولیک قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و شاهد

آزمون ویلکاکسون		بعد از مداخله		قبل از مداخله		فشار خون سیستولیک گروه
P		انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	
۰/۰۰		۱۱/۱۹	۱۴۹/۹۴	۱۰/۸۶	۱۵۶/۵۵	آزمون
۰/۰۰		۱۲/۳۳	۱۶۲/۰۱	۱۲/۴۴	۱۵۸/۰۸	شاهد
		P = ۰/۰۰		P = ۰/۳۳		آزمون من - ویتنی

داری را نشان می دهد ($p = 0/00$). آزمون آماری ویلکاکسون بین میانگین فشار خون دیاستولیک در قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون اختلاف معنی داری را از نظر کاهش میزان فشار خون نشان نمی دهد ($p = 0/86$) ولی این آزمون بین میانگین فشار خون دیاستولیک پس از اتمام مداخله در دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی می دهد ($p = 0/00$).

آزمون آماری من - ویتنی بین میانگین فشار خون دیاستولیک در دو گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله تفاوت معنی داری را به لحاظ آماری نشان نمی دهد ($p = 0/86$) ولی این آزمون بین میانگین فشار خون دیاستولیک پس از اتمام مداخله در دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی دارد.

جدول شماره ۲) مقایسه میانگین فشار خون دیاستولیک قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و شاهد

آزمون ویلکاکسون		بعد از مداخله		قبل از مداخله		فشار خون دیاستولیک گروه
P		انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	
۰/۰۰۰		۵/۴۱	۹۳/۶۵	۸/۰۹	۹۷/۸۸	آزمون
		۶/۰۶	۹۹/۹۳	۶/۰۸	۹۸/۲۳	شاهد
P = ۰/۰۰		P = ۰/۸۶		آزمون من - ویتنی		

پژوهش‌های انجام شده با روشی مشابه، که در طول مدت زمان بیشتری پیگیری شده‌اند، نشان می دهد که کاهش فشار خون دیاستولیک و سیستولیک و به طور کلی اثر بخشی روش مداخله بیشتر بوده که به نظر می‌رسد علت آن، تمرین و تکرار بیشتر و استمرار زیادتر انجام تکنیک آرام سازی می‌باشد و بعلاوه اینکه تمام زمانهای انجام مداخله تحت نظر و آموزش پژوهشگر بوده است و به رفع اشکال و انجام صحیح تکنیک به فرآگیران کمک می‌نموده و از سویی دیگر چون این تکنیک نیاز به درگیری فعال مددجو با طرح درمانی دارد و مربی آموزشی، نقش فعالی در حمایت و کمک به فرآگیر دارد و از طرفی دیگر اکثر پژوهش‌های انجام شده در این زمینه خاطر نشان کرده‌اند که جهت دست‌یابی به نتایج مثبت بیشتر نیاز به تمرین و تکرار بیشتر این تکنیک‌ها و نظارت و آموزش مستقیم تحت نظر مربی می‌باشد، لذا پژوهشگر نیز

بحث

یافته‌های پژوهش نشان می دهند در گروه آزمون که تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی در مورد آنان بکار برده شده فشار خون سیستولیک ۶/۶۱ میلی متر جیوه و فشار خون دیاستولیک ۴/۲۳ میلی متر جیوه کاهش یافته است در حالی که در گروه شاهد در طی همین مدت زمان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک افزایش داشته‌اند.

در تحقیقی که اشنایدر (Schnider et al) (۲۰۱۱) در سال ۲۰۰۵ در یک مرکز درون شهری به مدت ۳ ماه تاثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی را روی افراد سالم‌مند ۸۵-۵۵ پس از ۴ جلسه آموزش تکنیک آرام سازی پیگیری کردند نتایج نشان دادکه فشار خون دیاستول ۴/۳۱ و فشار خون سیستول ۵/۰ میلی متر جیوه کاهش داشته است (۰/۰۰۳). نتایج پژوهش حاضر نسبت به پژوهش توصیف شده قبلی و سایر



8-keil JE, Sutherland SE, knapp RH, Lackland DT, Gazes PH. Mortality rates and risk factors for coronary disease in elderly people. *N Engl J Med.* 2000; 342(6): 453-460.

7- حسینی بروجنی، سید محسن. بررسی تأثیر ورزش‌های هوایی بر فشار خون کارمندان مبتلا به پرفشاری خون اولیه مراجعه کننده به درمانگاه و مراکز بهداشتی درمانی شهر بروجن، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲.

10- یوسفی، حجت‌الله. بررسی تأثیر روش‌های غیر دارویی بر کاهش فشار خون در بیماران هیپرتانسیونی، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی، دانشکده پژوهشکی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳.

11-Lyles MF, Macmahon S. Adverse effects of antihypertensive therapy in adult people. *Clin Geriatr Med.* 5(2); 1998.

12-Stason N. Economic issues relating to access cost and quality off in treatment of hypertension in elderly patients. *Hypertension.* 2003; 43(1):145-148.

13-Rumsfeld J, magid DJ, Plomondon NE. Predictors of quality of life following acute coronary syndromes. *The American journal of cardiology.* 2001; 88(45):781-784.

14-Applegate WB. Hypertension in elderly patients. *Ann Intern Med.* 1999, 130(110); 901-915.

15-Lyles MF, Macmahon S. Adverse effects of antihypertensive therapy in adult people. *Clin Geriatr Med.* 1998, 5 (2)

16-Trial of hypertension prevention collaborative research group(TOHP).The effect of non-pharmacologic intervention on blood pressure of person with high blood pressure: Results of trials of hypertension prevention, phase 1. *JAMA.* 2000; 283(22):417-423

17-Sohrarse D, Scatolhd F. pharmacological aspects of aging: A survey of the effect of increasing age on drug activity in adults. *J. AM . geriatr.* 50c, 2001, 12(2); 114-134.

18-Adamopoulos P, Crysto phcolomb S, Fronich ED. Systolic and diastolic hypertension – nonhomogeneous disease. *AMJ Cardio.* 2002, 36(106); 697-701.

19-Jacob RG, Chesney MA, William DM, Ding Y, Shapiro AP. Relaxation therapy for hypertension: design effect and treatment effects. *Ann Behav med.* 2005, 30(74); 135-142.

20-Pall C, etal. Relaxation and Behavior therapy: behavior techniques for hypertension. 2004, 111(204);1971.

21-Schneider RH, Egan BM, Johnson EH, Drobny H. Anger and anxiety in hypertension. *Psychosom Med.* 2005, 48(102);242-248.

22-Richard MS, Gaarder KR, Engl BT. Behavior treatment of high blood pressure: acute and sustained effect of relaxation and systolic blood pressure biofeed back. *Psychosom med.* 2002, 44(93); 555-570.

اقدام به انجام مداخله به صورت مستقیم تحت نظر و آموزش خود برای واحدهای پژوهشی نمود. در مطالعه ریچارد (Richard) و همکاران (2001)، که روی بیماران مبتلا به هیپرتانسیون در طی ۶ماه پیگیری انجام دادند و بیماران را به سه گروه تقسیم نمودند، گروه اول تکنیک آرامسازی را مستقیماً زیر نظر مرتبی به مدت ۶ دقیقه انجام می‌دادند، گروه دوم تمرینات را در خانه توسط نوار کاست انجام می‌دادند و گروه سوم روان درمانی شدند و تمرینات آرامسازی را انجام نمی‌دادند، نتایج نشان دادند که بهترین نتیجه در مورد کاهش فشار خون در گروهی که تکنیک راحت نظر و آموزش مرتبی انجام می‌دادند به دست آمده است.

نتیجه‌گیری

فرضیه حاصل از این پژوهش و سایر پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده نتایج پژوهش حاضر را مورد تایید قرار می‌دهند. در پایان با توجه به نتایج کسب شده از این تحقیق و سایر پژوهش‌های دیگر و شیوع هیپرتانسیون در بین گروه سنی سالمند و همچنین شیوع واکنش‌های نامطلوب دارویی در این افراد پیشنهاد می‌شود که می‌توان از نتایج این تحقیق در درمان و کنترل فشارخون در سالمندان مبتلا به هیپرتانسیون استفاده نمود. چراکه علاوه بر نداشتن عوارض دارویی موجب کاهش قابل توجه در هزینه‌های درمان نیز می‌شود.

منابع:

- 1-Niksson p, Andersson D, Anderson p, schwan A, malmborg R, etal. Cardiovascular risk factors in treated hypertensive:A nationwide , cross sectional studuy in Sweden. *J International Med.* 2004,233(60):233-245
- 2-Charles N, Alexander P, Robert H, Schneider H, frank stagger S, etal. Trial of stress reduction for hypertensive in older African Americans. *American Heart Association, Inc.* 2005; 26: 135-152
- 3-Collins R, peto R, Macmahon S. Blood pressure, stroke and coronary heart disease, part II : short-term reductions in blood pressure: overview of randomized drug trials in their epidemiological context. *Lancet.* 2000; 355(7123): 107-119
- 4-Walker Z, Townsend J, Dakley L, etal . Health promotion for adolescents in primary care: randomized controlled trial . *BMJ,* 2002; 325(7): 521-600
- 5-Gary R, Anderews S. Care of older people, promoting health and function in aging pouplation. *J American Med.*2000; 20(14):52-69
- 6-Lindholm L, Scherten B. High risk of cerebro-cardio-vascular morbidity in well treated hypertensive. *Aceta Med Scand.*1999; 213:89-95.

7- تاجور، مریم، فرزیان پور، فرشته. بهداشت سالمندان و مزوری بر جنبه‌های مختلف زندگی آنان. انتشارات نسل فرد، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص. ۴۹.