

زخم فشار و راههای پیشگیری و درمان

چکیده:

زخم فشار و یا زخم بستر یک آسیب یا ضایعه در پوست و بافت‌های زیرین آن محسوب می‌شود و معمولاً بدنبال فشار غیرقابل رفع برنسوج ایجاد می‌شود و در افراد پیر و کسانی که در مراحل بحرانی بیماری می‌باشند یک مشکل عمدۀ بوده و باعث ایجاد دارد، کاهش کیفیت زندگی و اقامات‌های طولانی در بیمارستان می‌گردد.

پیشگیری و درمان زخم برای بهبود وارقاء وضعیت تندرستی بیمار از راهکارهای مقرران به صرفه به شمار می‌آید.

هرگاه در مدت زمانی بیش از ۲ ساعت، فشار موجود بر عروق کاپیلری شریانها در نقطه ای به حدود ۷۰ mm-Hg (بیش از ۲ برابر فشار کاپیلری شریانها) بر سر زخم فشاری از خم بستر ایجاد خواهد شد که بر حسب عمق گرفتاری به ۴ نوع تقسیم می‌شود. مهمترین نکته در پیشگیری از ایجاد زخم فشاری از خم بستر، کاهش فشار از آن نقطه مورد نظر می‌باشد که بهترین کار برای کاهش و رفع فشار جابجا کردن بیمار می‌باشد.

در صورت بروز زخم فشار می‌بایست بر حسب نوع زخم، درمان مربوطه (پانسمان، آنتی‌بیوتیک تراپی، دبریدمان، جراحی) رانجام داد.

کلید واژه‌ها: زخم فشار / زخم بستر / پانسمان

* دکتر بیژن خراسانی

جراح عمومی، استادیار دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی

دکتر علی غفوری

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

* E-mail: bkhorasany@hotmail.com



مقدمه

است که ضمن ساده تر بودن و اثر بخش تر بودن با هزینه های بسیار کمتر می توان بیمار را درمان کرد اما در صورت بروز زخم خصوصاً نوع سوم و چهارم ضمن اینکه شاید نتیجه مطلوب حاصل نگردد بلکه ممکن است بیمار هزینه های بسیار سر سام آوری را متحمل شود.

با دسترسی به تاریخ چه و معاینه بیمار می توان عوامل ایجاد کننده و مستعد کننده رخم فشار را تعیین کرد و سپس اقدامات تخصصی را انجام داد^(۹). عوامل موثر در پیشگیری از ایجاد رخمهای بستری را زیر شرح می شود:

۱- کاهش فشار

کاهش فشار مهمترین عامل در جلوگیری از ایجاد رخمهای فشار می باشد و این کار را به دو روش می توان انجام داد:

الف) نحوه استقرار بیمار:

وضعیت دهی مناسب برای بیماران دائم استری، با یک برنامه منظم در چرخش و جابجا کردن بیمار آغاز می شود^(۱۰-۱۱). (بیماران استری حداقل هر دو ساعت و بیماران روی صندلی، حداقل هر یک ساعت جابجا شوند) علاوه بر چرخش و جابجا کردن بیمار، نحوه استقرار بدن بیماران استری نیز مهم است.

– بیماران در موقع دراز کشیدن به پهلو باید در یک زاویه ۳۰ درجه قرار گیرند
(جهت پیشگیری از رخم تروکانتر)

– جهت جلوگیری از فشار بر قوزک پا و زانوها بهتر است یک بالش یا یک قطعه اسفنجی بین پاها و زیر قوزک قرار داد.

– پاشنه ها به مراقبت ویژه ای نیاز دارند. برای بالا آوردن پاشنه ها باید بالش هایی زیر قسمت انتهایی ساق قرار داد.

– بیمارانی که مجبورند مداوم بر روی صندلی بنشینند فشار زیادی را بر روی استخوانهای نشیمنگاهی متحمل می شوند، جهت پیشگیری از ایجاد رخم ضروری است هر ساعت از نظر نحوه نشستن جابجا شوند.

ب) استفاده از وسایل کاهش فشار:

بیش از ۱۰۰ نوع وسیله کاهش فشار برای جلوگیری از رخم فشار در بیماران دائم استری وجود دارد^(۱۲).

– وسایل استاتیک: شامل دولا یه بالا و زیرین که تشکهایی از ژل، اسفنج، هوا و آب بین آنها قرار می گیرد و فشار موضعی را در یک سطح پهن تری توزیع می کنند.

– وسایل دینامیک: در این گونه وسایل از یک منبع نیرو برای ایجاد جریانات متناوب هوا به منظور تنظیم و توزیع مجدد فشار بر بدن استفاده می شود.

کارآیی این وسایل در تحقیقات مختلف بررسی شده است. در یک گزارش استفاده از تشك اسفنجی ۶ اینچی در بین بیماران پیر مبتلا به شکستگی لگن باعث کاهش رخم بستر از ۶۸٪ به ۲۴٪ شده است^(۱۳) و در گزارش دیگری بر روی بیماران ICU که از تشك هوا استفاده کرده بودند میزان بروز رخمهای بستر کمتر بوده است^(۱۴).

زخم فشار و رخمهای بستریکی از مشکلات عمده بیمارانی است که مجبورند مدت ها در بستر یا در یک وضعیت ثابت قرار گیرند. بیشتر این بیماران مشکلات زمینه ای جراحی نیز دارند که این مشکلات درمان رخمهای راسخت تر و پرهزینه تر می کند^(۲).

زخم بستریک نوع از رخم فشار می باشد و هرگاه برای مدتی بیش از ۲ ساعت فشار موجود بر عروق کاپیلری شریانها در نقطه ای به ۷۰ میلی متر جیوه (بیش از ۲ برابر فشار کاپیلری شریانها) برسد بدنبال عدم اکسیژن رسانی مناسب به بافت منجر به ایسکمی و نهایتاً رخم خواهد شد^(۳).

افراد مستعد رخم بستر شامل: (۴)

الف: افرادی که طولانی مدت بستری هستند (bedridden)

ب: افرادی که تحرک ندارند (immobile)

ج: عدم هوشیاری (unconscious)

د: افرادی که حس درد ندارند.

باید توجه داشت که نقاط برجسته بدن مانند پاشنه ها، ایسکیوم و تروکانتر در حالت خوابیده یا نشسته بیشتر در معرض فشار بوده ولذا بروز رخم نیز در این نقاط بیشتر خواهد بود.

بحث

رخم بستر بر حسب عمق گرفتاری به ۴ مرحله تقسیم می شود^(۵-۸):

مرحله ۱:

بروز تغییرات مرتبط با فشار در نقطه ای که تحت فشار می باشد، بطوریکه در مقایسه با پوست سالم که تحت فشار نیست، تفاوت های عمده ای دارد که شامل قرمزی، گرمی و درد و حالت اسفنجی و یاسفت و سخت پوست باشد.

مرحله ۲:

در این مرحله اولین علائم آسیب و تخریب بخشی از ضخامت پوست (اپی درم یا درم) مشاهده می شود. از نظر علائم بالینی علاوه بر علائم بالا می توان تاول را نیز مشاهده کرد.

مرحله ۳:

این مرحله با از بین رفتن تمام ضخامت پوست، نکروز و صدمه بافت زیر جلدی همراه است. این آسیب ممکن است تا فاشیا هم پیشروی کند اما از آن فراتر ننمی رود.

از نظر بالینی بصورت یک رخم عمیق با یا بدون نفوذ در بافت های مجاور تظاهر می کند.

مرحله ۴:

با از بین رفتن تمام ضخامت پوست، توام با تخریب گستردگی و نکروز بافت که بصورت صدمه به عضلات، استخوان یا بافت های زیرین بروز می کند.

پیشگیری:

یکی از مهمترین نکات در بحث رخمهای فشار و رخم بستر اقدامات پیشگیرانه

٦- حذف فشار:

در درمان زخم‌های فشار ابتدا باید فشار بر رافت را که مهمترین عامل ایجاد زخم می‌باشد از بین برد که روش‌های لازم در مبحث پیشگیری توضیح داده شده است.

کلایمیاران باید طوری قرارگیرند که از واردشدن فشار به موضع زخم خودداری گردد تشكهای مختلف از جمله تشكهای حاوی هوا - مایع (که بطور متناوب جریان هوا - مایع جابجا می شود = وسایل دینامیک) و تشكهای استاتیک (که از لایه های اسفنجی استفاده شده است) در کاهش ایجاد زخم موثرند. در یک تحقیق بر روی ۶۵ بیمار متلاطه زخم بسته (۳۱) بیمار از تشكهای هوا - مایع با جابجایی هر ۴ ساعت و ۳۴ بیمار از تشكهای اسفنجی با جابجایی هر ۶ ساعت) نشان داده شد که کاهش سطح زخم در گروهی که از تشكهای هوا - مایع استفاده می کردند بسیار بیشتر بوده است (۱۸).

شکهای استاتیک را در بیمارانی که قادر به جابجایی خود هستند استفاده کنند اما در بیمارانی که قادر به جابجایی خود نمی‌باشند باید از وسایل یتامیک استفاده کرد.

۱- مراقبت از ذخیره فشار:

جهت نیل به این هدف باید سه اصل زیرا رعایت کرد:

- الف: تمیز کردن زخم (Cleaning)
- ب: پرطوف کردن بافت‌های مرده (Debridement)
- ج: پاسیمان زخم (Dressing)

ف - تمیز کردن زخم:

ترمیم و بهبودی در زخم‌های تمیز بیشتر صورت می‌گیرد. زخمها باید از بافت‌های سرد، ترشح زیاد زخم و دبریدهای پاک شوند در غیر اینصورت ترمیم و بهبودی خم آهسته بوده، و ممکن است عفونت نیز ایجاد شود. جهت تمیز کردن زخم می‌توان زخم را با سرم شستشو بهمراه گازی که به آرامی داخل زخم کشیده شود از وجود بافت‌های مرده پاک کرد. باید دقت کرد تا از آنتی‌سپتیک‌ها از ندید بتا دین یا پراکساید هیدروژن جهت تمیز کردن استفاده نکرد، زیرا این واد باعث آرزوگی بافت‌های حساس شده و از پروسه بهبودی جلوگیری می‌کند.

وجود بافتگهای مرده در زخمها فشار باعث تاخیر در ترمیم و منجر به عفونت خم خواهد شد. به لحاظ دردنگ بودن دیریدمان بافتگهای مرده از زخم سیاست نسبتاً کساعت قا از آن از مسک: هالستادم ک-

بریدمان زخمها به چهار صورت ذکر شده در "زیر می باشد و معمولاً آنها بصورت تلفیقی از یکدیگر بکار میگیرند.

- دیر بدمار، مکانیک:

ین روش شامل استفاده از پانسمانهای خیس تا خشک، هیدرو تراپی، مستشوی زخم و مالیدن زخم با گاز می‌باشد. این روشها برای زخم‌هایی که ارای ترشحات و بافت‌های نکروز هی شل می‌باشند، بهترین روش است.

استفاده و انتخاب یک وسیله مناسب برای پیشگیری از زخم‌های بستر براساس ملاحظاتی چون هزینه، سهولت استفاده، خطر ایجاد زخم و سایر ویژگهای مرتبی با بیمار می‌باشد (۱۵).

۲- آموزش وسازماندهی

آموزش و سازماندهی مراقبتهای بهداشتی - درمانی دو عامل کلیدی در پیشگیری از ختمهای فشار و یا ختمهای بستر می‌باشند.

آموزش باید در راستای تربیت نیروی بالینی، آموزش بیماران و خانواده‌ها و حتی باید شامل اطلاعات مربوط به زمینه‌ای فشار و نحوه جلوگیری از آنها باشد. در یک تحقیق در خصوص بیماران بسترسی، موقع زخم‌های بسترس پس از اجرای یک برنامه آموزشی از ۱۵٪ به ۵٪ کاهش یافت (۱۶).

سازماندهی ارائه خدمات بهداشتی درمانی، شامل اقدامات هماهنگ تخصصات و پرسنل بالینی در رشته‌های مختلف است که در پیشگیری از خمها، جنبه حیاتی و مهمی دارد. نقش تمام پرسنل و خط مشی‌ها و روشهای بطور صریح در کتابچه‌ای توضیح داده شود و ضروری است این کتابچه را اختیار تیم درمانگر و درمانپذیر قرار گیرد.

۱- کارآیی:

جرای روشهای فوق الذکر از عوامل موثر در کاهش بروز زخمهای شاری است. با این وجود این موضوع قطعاً روشن نشده که آیا تمام زخمهای ستر با اجرای بهترین روشهای پیشگیری قبل جلوگیری هستند و یا اینکه ممکن است برخی بیماران چنان در خطر بالائی باشند که جلوگیری از بروز خم امکان پذیر نباشد.

یک نظر سنجی از متخصصان در این زمینه نشان داد که ۶۲٪ از آنها با این جمله که: تمام زخمهای بستر قابل پیشگیری می باشند. مخالف بودند (۱۷). در نظر گرفتن این واقعیت که یک بیمار زمینگیر و دانمایستری را باید سالیانه ۴۰۰ بار از نظر نحوه استقرار بدن جابجا کنیم، درک این نکته که چرا در برخی بوارد امکان شکست و وجود دارد آسان خواهد شد. یکی از مشکلات بزرگ در یماران مبتلا به زخم فشار صرف هزینه های بسیار سرسام آور می باشد. لذا رائے مراقبتهای پیشگیرانه‌ی مناسب به صرفه جویی قابل توجهی منجر شود. انجام اقدامات پیشگیرانه در یک تحقیق ضمن جلوگیری از ایجاد خم، باعث صرفه جویی در هزینه به میزان ۷۰۰ دلار برای هر بیمار بوده است.

مان: سا درمان پس از ایجاد زخم، دهها هزار دلار هزینه در بر دارد (۱۴).

رمان زخم‌های فشار بصورت تیمی است این تیم ممکن است شامل پزشک، رستار، متخصص تغذیه، داروساز، فیزیو تراپیست و باشد و هر فرد بر ساس و ظایف و خط مشی که در کتابچه مخصوص قید شده باید انجام وظیفه مانند.

رمان و بهبودی زخمهای فشار بر اساس سه اصل مهم زیر می باشد.

حذف فشار

مراقبت از زخم

- تغذیه مناسب



درمان عفونت زخم:

به کلونیزاسیون (وجود بیش از 10^5 عدد باکتری در هر گرم بافت) همراه با علائم کلینیکی مانند درد، قرمی، گرمی، ادم و آگزودای چرکی، عفونت زخم گویند(۱).

پرسه بهبود زخم در اثر وجود عفونت مختلط می‌شود (۲۲ و ۲۳)، لذا کنترل و درمان و حتی پیشگیری از بروز آن ضروری است. برای آن دسته از زخمها که تظاهرات عفونی ندارند اما از نظر کلینیکی در حال بهبود نمی‌باشند می‌توان از یک درمان دوهفته‌ای آنتی‌بیوتیک موضعی مانند سولفادیازین نقره، جنتامایسین و موپیروسین سود بد (۲۴). آنتی‌بیوتیک‌های سیستمیک در عفونتهای جدی زخم بستر (باکتریمی، استئومیلیت) استفاده می‌شوند.

پانسمان، خم:

مایع زخمها ممکن است حاوی فاکتورهای رشد بافت باشند که باعث تسهیل اپیتیلیازاسیون مجدد (Reepithelialization) می‌گردد. پتانسیل آغاز آن را می‌توان با استفاده از پانسمانهایی که محيط زخم را مطرد و اطراف زخم را بنا براین با استفاده از پانسمانهایی که محيط زخم را مطرد و اطراف زخم را خشک نگه می‌دارند، می‌توان زخم را در شرایط مطلوب برای بهبودی قرار داد (۲۵ و ۲۶). پانسمان با گازآغشته به سالین باعث مطرد شدن زخم شده و از خشک شدن آن نیز جلوگیری می‌کند. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ نوع پانسمان در بازار وجود دارد که هیچگونه برتری خاصی نسبت به یکدیگر در ترمیم زخم دارند. می‌توان اینها را با توجه به اینکه آنها استفاده ممکن شود (۲۷) در

از انواع این پانسمانها می‌توان به فیلم‌های ترانسپاریک، هیدرولله، آلزینات‌ها، هیدروکلوئیدها، کلاژنها، اسفنجها و پرکننده حفره زخم و پانسمانهای سیلور اشاره کرد که عمدتاً سعی شده محیط مرطوبی را در زخم

ایجاد نمایند.

زخم‌های بستر می‌توانند در دنک باشند. عمدتاً جهت پرهیز از بروز عوارض جدی مخدرهای خوراکی، از داروهای مسکن خوراکی با دوز پائین استفاده می‌شود که ممکن است درد با آنها تسکین پیدا کند. از طرفی مصرف موضعی مخذل‌های دستیک دم، توانند موثر باشند (۲۹ و ۳۰).

برای رخمهای بستر در مرحله سوم و چهارم جهت دبیریدمان زخم و حذف
رافتهای نکرهنگاری است: مسک: ها جهت تسکین، درد استفاده کرد.

三

بیشتر زخمهای فشاری استفاده از اصول اساسی مراقبت از زخم که به آنها اشاره شد بهبود می‌یابند. با این وجود در برخی بیماران خصوصاً در بیمارانی که کیفیت زندگی آنها به میزان قابل توجهی به بهبود و بسته شدن سریع زخم بستگی دارد، جراحی ضروری است. لذا تصمیم به جراحی، به نظر بیمار، اهداف درمان، خطر عود، وجود عفونت و کیفیت زندگی او بستگی دارد. از روشهای جراحی مختلفی در درمان زخمهای استفاده می‌شود که از جمله به: بستن مستقیم زخم، پیوند پوست، فلاپ پوستی، فلاپ ماهچه‌ای - جلدی و فلاپ آزاد می‌توان اشاره کرد. انتخاب روش جراحی نیز به ویژگیهای خود بیمار، محل زخم و تبحر جراح نیز بستگی دارد.^(۳۰)

II - دبریدمان تیز (Sharp): از چاقوی جراحی و قیچی استفاده می‌شود. این روش زمانی تجویز می‌شود که شواهدی از سلولیت یا سپسیس (sepsis) وجود داشته باشد. این روش را برای برداشتن بافت‌های مرده یا بافت‌های نکروتیک گستردۀ نیز استفاده می‌کنند. بیمارانی که دارای زخم پاشنه می‌باشند و زخمی با لا یه ضخیم از بافت نکروتیک آن را پوشانده باشد از این قانون (دبریدمان تیز) مستثنی هستند و این لا یه را نباید دبریدمان کرد (۱۹).

III - دیر یدمان آنژیمی:

در این روش با استفاده موضعی از کلاژنаз، پاپائین (papain)، فیبرینولیزین و دی‌اکسی ریبونوکلئاز می‌توان به هدف در بیدمان دست یافت (۲۰ و ۲۱). این روش و استفاده از این مواد برای بیمارانی که تحمل عمل جراحی را ندارند مفید می‌باشد (۱۹).

- در بدمان متنی بر اتولیز:

در این روش پس از پانسمان زخم، بافت‌های نکروتیک بوسیله آنزیمهایی که بطور نرمال در بافت‌های زخم وجود دارد، تحلیل می‌روند. این روش غالباً در زخمهایی که کمترین میزان بافت مرده را دارد بکار می‌رود و در صورت وجود عفونت نمی‌توان از آن استفاده کرد. باید پس از برداشتن کامل بافت نکروزه و در شرایطی که بافت گرانوله در زخم وجود دارد کار دبریدمان متوقف گردد.

ج) اقیت و ده ماه، خدمهای فشاو بر اساس هر مرحله:

محله ۱، ماقیت د.

مهتمترین کار بر طرف کردن فشار از محل تحت فشار می باشد، تمیز کردن ناحیه مورد نظر با آب گرم و خشک نگه داشتن آن و اصلاح تغذیه بیمار و بررسی آن را می توان در نظر گرفت.

دقيق وصعيّد رسم ارسنال

علوه بر اقدامات مرحله اول ضروری است زخم را با محلول سالین شستشو و تمیز کده و سس، محا، مورد نظر را بانسمان نمود.

۳۱ - ۲ - ۷

علاوه بر اقدامات مرحله اول و دو اين مرحله مراقبت ويزههای رانیاز دارد که شامل:
دربریدمان زخم، اقدام جراحی جهت برطرف کردن بافت‌های مرده زخم،
پانسمانهای مخصوص و استفاده از آنتی‌بیوتیکهای موضعی و سیستمیک

تمام موارد بالا برای این مرحله هم نیاز است اما به خاطر عمق زخم مراقبت ویژه‌ای را می‌طلبد. وجود تب، ترشحات سبز و زرد و گرمی محل زخم، دلیل بر پیشرفت و گسترش عفونت می‌باشد که در این حالات احتمال سپسیس بالاست و حتی می‌تواند منجر به مرگ شود. گاه‌ها در این مرحله نیاز است بیمار برای چند هفته در بیمارستان بستری و تحت دبریدمان جراحی و آنتی‌بیوتیک تا اتمام درمان مسیستمیک قرار گیرد.



نتیجه گیری

جهت پیشگیری از فشار روی بافتها ابتدا باید عواملی که منجر به بروز زخم فشار می‌گردند را برطرف کرد و ضمن حذف عوامل زمینه‌ای با جایه جا کردن مستمر و مکرر بیمار (در افراد بسته هر یک ساعت و افرادی که روی صندلی هستند هر نیم ساعت) از فشار روی بافتها پیشگیری کرد. یکی از نکات مهم بیماران در معرض زخم فشار، آموزش مراقبت‌های لازم در مورد زخم فشار به بیمار و اطرافیان است. با توجه به هزینه‌های سیار بالا و کیفیت زندگی ناخوشایند پس از بروز زخم بستر ضروری است در مورد این بیماری آموزش‌های لازم به کادر درمانی خصوصاً کادر پرسنال داده شود و استفاده از جزوهای آماده و تحویل آنها به بیمار و همراهان آنها نیز کمک شایانی در جلوگیری از بروز زخم فشار خواهد کرد. در بیمارانی که در معرض زخم فشار هستند، پوست و بافت در معرض زخم باید تحت نظر باشد تا در صورت ایجاد زخم اقدامات لازم در هر مرحله انجام شود.

علاوه بر راههای عنوان شده، انواع درمانهای دیگر نیز جهت درمان زخمهای

بستر تحت بررسی می‌باشد. که شامل موارد زیر می‌باشد:

— چندین تحقیق و مطالعه نشان داده که بکارگیری فاکتورهای رشد در زخم نظیر فاکتور رشد فیبروبلاست‌ها، فاکتورهای رشد مشتق از پلاکت و فاکتورهای رشد عصبی می‌توانند به ایجاد بهبودی زخم کمک کنند.

— الکتروترپی، که در آن با استفاده از یک جریان مستقیم که باعث افزایش حرکت و گسترش فیبروبلاستها می‌شود بهبودی زخم حاصل می‌شوند (۳۱-۳۳).

— درمان زخم بستر با ایجاد فشار منفی در زخم با استفاده از یک واکیوم باعث بهبود سریع زخم می‌شود. این امر باعث کاهش ادم در اطراف زخم، تحریک جریان خون و افزایش گرانولاسیون می‌شود (۳۴-۳۵).

— درمان با اکسیژن هیپرباریک (HBO) نیز در بهبود زخم فشار مطرح شده است اما عوارضی چون پنوموتوراکس نیز گزارش شده است (۳۶).

پیش‌آگهی

بیماران دارای زخم فشار خصوصاً زخم بستر تقریباً ۲ یا ۳ برابر بیش از بیماران بدون زخم در معرض مرگ قرار می‌گیرند (۳۷-۳۹). کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به زخم نیز بسیار ناخوشایند است.

منابع:

- (۱) حاذقی، ک (مترجم)، آنتروباکتریاسه، میکروبیولوژی پزشکی، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، ۱۳۷۰ - چهارم ۶۲۴-۶۲۱
- 14) Inman, KJ, Sibbald, WJ Rutledge, FS, Clark, BJ. Clinical utility and cost- effectiveness of an air suspension bed in the prevention of pressure ulcers. JAMA 1993; 269: 1139.
- 15) Jay, R. Other considerations in selecting a support surface. Adv Wound Care 1977;10:37.
- 16) Moody, B, Fanale, J, Thompson, M, et al. Impact of staff education on pressure sore development in elderly hospitalized patients. Arch Intern Med 1988; 148:2241.
- 17) Brandeis, GH, Berlowitz, DR, Katz, P. Are pressure ulcers preventable? A survey of experts. Adv Skin Wound Care 2001; 14:244.
- 18) Baier, RR, Gifford, DR, Lyder, CH, et al. Quality improvement for pressure ulcer care in the nursing home setting: the Northeast Pressure Ulcer Project. J Am Med Dir Assoc 2003; 4:291.
- 19) Treatment of Pressure Ulcers.Clinical Practice Guideline Number 15, AHCPR Publication no. 95-0652, December 1994.
- 20) Rao, DB, Sane, PG Georgiev, EL. Collagenase in the treatment of dermal and decubitus ulcers. J Am Geriatr Soc 1975;23:22.
- 21) Lee, LK, Ambrus, JL. Collagenase therapy for decubitus ulcers, Geriatrics 1975; 30:91.
- 22) Bendy, RH Jr, Nuccio, PA, Wolfe, E, et al. Relationship of quantitative wound bacterial counts to healing of decubiti: effect of topical gentamicin. Antimicrob Agents Chemother 1964; 10:147



- 23) Daltrey, DC, Rhodes, B, Chatwood, JG. Investigation into the microbial flora of healing and non-healing decubitus ulcers, *J Clin Pathol* 1981; 34:701.
- 24) Kucan, JO, Robson, MC, Heggers, JP, Ko, F. Comparison of silver sulfadiazine povidone- iodine and physiologic saline in the treatment of chronic pressure ulcers. *J Am Geriatr Soc* 1981; 29: 232.
- 25) Gorse, GJ, Messner, RL. Improved pressure sore healing with hydrocolloid dressings. *Arch Dermatol* 1987; 123: 766.
- 26) Sebern, MD. Pressure ulcer management in home health care: Efficacy and cost- effectiveness of moisture vapor permeable dressing. *Arch Phys Med Rehabil* 1986; 67: 726.
- 27) Graumlich, JF, Blough, LS, McLaughlin, RG, Milbrandt, JC. Healing Pressure Ulcers with Collagen or Hydrocolloid: A Randomized, Controlled Trial. *J Am Geriatr Soc* 2003; 51: 147.
- 28) Flock, P. Pilot study to determine the effectiveness of diamorphine gel to control pressure ulcer pain. *J Pain Symptom Manage* 2003; 25:547.
- 29) Zeppetella, G, Paul, J, Ribeiro, MD. Analgesic efficacy of morphine applied topically to painful ulcers. *J Pain Symptom Manage* 2003; 25: 555.
- 30) Niazi, ZB, Salzberg, CA. Surgical management of pressure ulcer. *Ostomy wound Manage* 1997; 43:44.
- 31) Griffin, JW, Tooms, RE, Mendius, RA, et al. Efficacy of high voltage pulsed current for healing of pressure ulcers in patients with spinal cord injury. *Phys Ther* 1991; 71:433.
- 32) Feedar, JA, Kloth, LC, Gentzkow, GD. Chronic dermal ulcer healing enhanced with monophasic Pulsed electrical stimulation .*Phys ther* 1991; 71:639.
- 33) Gardner, SE, Frantz, RA, Schmidt, FL. Effect of electrical stimulation on chronic wound healing: a meta-analysis. *Wound Repair Regen* 1999; 7:495.
- 34) Argenta, LC, Morykwas, MJ. Vacuum-Assisted Closure: a new method for wound control and treatment: clinical experience. *Ann Plast Surg* 1997; 38:563.
- 35) Joseph, E, Hamori, CA, Bergman, S, et. al. A prospective randomized trial of vacuum-assisted closure versus standard therapy of chronic nonhealing wounds. *Wounds* 2000; 12:60.
- 36) Wang, C, Schwartzberg, S, Berliner, E, et al. Hyperbaric oxygen for treating wounds: a systematic review of the literature. *Arch Surg* 2003; 138:272.
- 37) Thomas, DR, Goode, PS, Tarquine, PH, Allman, RM. Hospital-acquired pressure ulcers and risk of death. *J Am Geriatr Soc* 1996; 44:1435.
- 38) Berlowitz, DR, Wilking, SV. The short-term outcome of pressure sores. *J Am Geriatr Soc* 1990; 38:748.
- 39) Berlowitz, DR, Brandeis, GH, Anderson, J, Du, W. Effect of pressure ulcers on the survival of long-term care residents. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 1997; 52:M106.