

Research Paper: Effect of Custom-Made Insole Fabricated With Medial Heel Skive Technique on Plantar Pressure in Individuals With Patellofemoral Pain Syndrome

Gholam Reza Aminian¹, *Fatemeh Bahramian¹, Masoumeh Bagherzadeh¹, Shima Fardipour¹, Zahra Safaeipour¹, Ameneh Abedian Avval²

1. Department of Orthotics & Prosthetics, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

2. Department of Orthotics & Prosthetics, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

Citation: Aminian GhR, Bahramian F, Bagherzadeh M, Fardipour Sh, Safaeipour Z, Abedian Avval A. [Effect of Custom-Made Insole Fabricated With Medial Heel Skive Technique on Plantar Pressure in Individuals With Patellofemoral Pain Syndrome (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2016; 17(3): 252-259. <http://dx.doi.org/10.21859/jrehab-1703252>

 DOI: <http://dx.doi.org/10.21859/jrehab-1703252>

Received: 01 Dec. 2015

Accepted: 20 Apr. 2016

ABSTRACT

Objective Knee problems, particularly patellofemoral pain syndrome (PFPS), are one of the common complaints of adolescents and young adults. PFPS is also known as "runner's knee" or "jumper's knee" due to its high prevalence among sportspersons. Its symptoms can be aggravated by ascending and descending stairs, squatting, deep squatting, kneeling, prolonged sitting, standing up from sitting, and running. Hence, it affects many aspects of daily life, including the ability to perform pain-free exercise or work-related activities. Non-surgical treatments such as physiotherapy, insoles, and knee orthoses are commonly used to treat people with PFPS. Insoles with medial heel skive is a new method of insole modification that can control pronation and involves the selective removal of small amounts of medial plantar heel of the positive cast of the foot. The aim of this study is to evaluate the effects of custom-made insole with medial heel skive technique on plantar pressure in PFPS subjects.

Materials & Methods In this controlled before-after study, 14 subjects with PFPS were recruited. Plantar pressure and contact area in eight areas of the foot with and without insole with medial heel skive technique were measured using the Pedar system. A paired t-test was used for statistical analysis.

Results The results of this study showed that the use of insole with medial heel skive technique resulted in decreased plantar pressure in the medial hind foot ($P=0.001$) compared to without insole. Also, the average plantar pressure ($P=0.003$) and contact area ($P=0.002$) in the medial mid-foot with the insole with medial heel skive significantly increased in comparison to without insole. However, no significant change was observed in other regions.

Conclusion The above-mentioned insoles managed to control pronation and alter plantar pressure distribution. However, since the insoles simply transferred the pressure from one area to another area and failed to distribute the pressure equitably over the examined regions, they cannot be considered to have improved plantar pressure distribution in patients with PFPS.

Keywords:

Patellofemoral pain syndrome, Insole, Foot orthoses, Plantar foot pressure, Pedar system

* Corresponding Author:

Fatemeh Bahramian, MSc.

Address: Department of Orthotics & Prosthetics, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Koodakyar Ave., Daneshjoo Blvd., Evin, Tehran, Iran.

Tel: +98 (913) 7854164

E-Mail: fbahramian69@gmail.com

بررسی تأثیر کفی سفارشی ساخته شده به شیوه "برداشت از بخش داخلی پاشنه" بر توزیع فشار کف پا در افراد مبتلا به سندروم درد پتلوفمoral

غلامرضا امینیان^۱، فاطمه بهرامیان^۲، معصومه باقرزاده^۱، شیما فردی‌پور^۱، زهرا صفائی‌پور^۱، آمنه عابدیان‌اول^۱

۱- گروه ارتودنسی فنی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران.

۲- گروه ارتودنسی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.



تاریخ دریافت: ۱۰ آذر ۱۳۹۴

تاریخ پذیرش: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

هدف در بین آسیب‌های مربوط به بزرگسالان و جوانان، مشکلات زانو از رایج‌ترین آن‌ها و سندروم درد پتلوفمoral از جمله شکایات متداول مبتلایان به‌شمار می‌رود و آنجایی که در افراد ورزشکار شیوع بالای دارد، به آن درد دونده‌ها نیز می‌گویند. سندروم درد پتلوفمoral یکی از اختلالات مربوط به زانوست که سبب ایجاد درد در جلوی زانو و اختلالات عملکردی در افراد مبتلا می‌شود. علایم این عارضه اغلب در ناحیه کشكک است. کرتیپاتسیون هم از علایم شایع در این بیماران است، این علایم با بالاپایین‌رفتن از پله، رانزدن، نشستن طولانی‌مدت و ایستادن از حالت نشسته شدت می‌یابد. علت ایجاد این سندروم متفاوت است و از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: پتلآلات، اختلالات فمور، نبودن تعادل عضلانی، افزایش ژاویو کیو و پرونیشن بیش‌از حد. سندروم درد پتلوفمoral در زنان در مقایسه‌با مردان شایع‌تر است. این سندروم با پرونیشن سایپتالار همراه است که به‌سبب آن نحوه توزیع فشار کف پا تغییر می‌کند. سندروم درد پتلوفمoral احتمال خطر ابتلاء به استوارتریت را افزایش می‌دهد؛ بنابراین درمان مناسب این بیماری اهمیت فراوانی دارد. روش‌های درمانی زیادی در این زمینه ذکر شده است که می‌توان آن‌ها را به دو گروه جراحی و غیرجراحی تقسیم کرد. فیزیوتراپی و کفی‌ها و ارتزهای زانو که به‌طور گسترده برای درمان افراد مبتلا به سندروم درد پتلوفمoral به کار می‌روند در گروه درمان‌های غیرجراحی قرار می‌گیرند. از کفی‌ها به‌طور گسترده در شرایط وجود پرونیشن بیش از حد مانند سندروم پتلوفمoral استفاده می‌شود. کفی‌های می‌توانند از طریق کامش پرونیشن درد را بهبود بخشد. یکی از این کفی‌ها، کفی با تکنیک برداشت از بخش داخلی پاشنه (قالب گچی) است. این تکنیک روش جدید اصلاح کفی است که پرونیشن را کنترل می‌کند. این تکنیک برداشتن مقدار کوچکی از قسمت داخلی سطح پشتار پاشنه را شامل می‌شود. کفی‌های می‌توانند علایم دکرشه را در این افراد بهبود بخشدند. هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر کفی ساخته شده با تکنیک برداشت از بخش داخلی پاشنه (قالب گچی) بر توزیع فشار کف پا در افراد مبتلا به سندروم درد پتلوفمoral است.

روش پژوهشی این مطالعه از نوع مطالعه کنترل شده به صورت قبل و بعد بود که در آن ۱۴ زن مبتلا به سندروم درد پتلوفمoral شرکت کردند. توزیع فشار کف پا و سطح تماس در این افراد با استفاده و بدون استفاده از کفی با تکنیک برداشت از بخش داخلی پاشنه (قالب گچی) در ۸ ناحیه در زیر پا با استفاده از سیستم پدار اندازه‌گیری شد. برای مقایسه دو حالت ناپرده آزمون آماری مقایسه زوج‌ها به کار رفت.

یافته‌ها نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد کفی ساخته شده با تکنیک برداشت از بخش داخلی پاشنه (قالب گچی) فشار کف پا در داخل ناحیه عقب پا را کاهش می‌دهد ($P=0.001$). همچنین میانگین فشار کف پا ($P=0.003$) و سطح تماس ($P=0.002$) در ناحیه داخلی قسمت میانی پا در حالت استفاده از کفی در مقایسه‌با بدون کفی به‌طور ممتازی افزایش یافت. در نواحی دیگر تفاوت معنادار دیده نشد.

نتیجه گیری کفی مدنظر در نحوه توزیع فشار تغییر ایجاد و میزان پرونیشن را حفظ کرده است. کفی مدنظر فقط نحوه توزیع فشار را ز

ناحیه‌ای به ناحیه دیگر منتقل کرده و نتوانسته است در تمام نواحی ارزیابی شده فشار را به طور یکنواخت و متناسب منتقل کند؛ بنابراین

نمی‌توان گفت که توزیع فشار کف پا را در افراد مبتلا به سندروم درد پتلوفمoral بهبود بخشیده است یا خیر.

کلیدواژه‌ها:

سندروم درد پتلوفمoral، کفی، ارتز پا، فشار کف پا، سیستم پدار

مقدمه

دردناک پتلوفمoral اغلب به جای زانوی دردناک دونده‌ها^۱ نیز استفاده می‌شود. علایم این پاتولوژی وجود درد در ناحیه کشكک است که با افزایش فعالیت شدت می‌یابد. این سندروم به علل مختلفی به وجود

یکی از شایع‌ترین اختلالات اسکلتی عضلانی ناحیه زانو در افراد بالغ جوان، سندروم دردناک مفصل پتلوفمoral است. واژه سندروم

1. Runner's knee

* نویسنده مسئول:

فاطمه بهرامیان

نشانی: تهران، اوین، بلوار داشجو، بنیست کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه ارتودنسی فنی.

تلفن: +۹۸ (۰۹۱۳) ۷۸۵۴۱۶۴

رایانامه: fbahramian69@gmail.com

کاهش دهد و از این طریق الگوی توزیع فشار را در افراد دچار سندروم درد پتلوفمورال تغییر دهد [۱۸، ۱۷]. از جمله کفی‌هایی که معمولاً برای افراد مبتلا به سندروم درد پتلوفمورال استفاده می‌شود کفی با گوشه داخلی است که قسمت پاشنه را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که کفی با شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه» یک‌سوم داخلی ناحیه پاشنه را دربرمی‌گیرد و بهنوعی به بیمار شوک عملکردی وارد می‌کند. همچنین به طور معمول اصلاحات کفش و کفی برای این بیماران در قسمت خارج کفی و کفش اعمال می‌شود؛ اما در کفی با شیوه مدنظر تمام اصلاحات در قالب مثبت انجام می‌شود.

این شیوه حجم کلی کفی را به منظور اندازه مطلوب در کفش کاهش می‌دهد. بررسی توزیع فشار کف پا می‌تواند اطلاعات مفیدی برای ارزیابی تأثیر ارتزدمنی بر اختلال یادشده فراهم کند. براساس جست‌وجوهایی که محققان مطالعه حاضر انجام داده‌اند، مطالعه‌ای در زمینه تأثیر کفی به شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه» بر توزیع فشار کف پایی در افراد مبتلا به سندروم درد پتلوفمورال یافت نشد. از این‌رو هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر کفی سفارشی ساخته شده به شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه» بر توزیع فشار کف پا در وضعیت پویای افراد مبتلا به سندروم درد پتلوفمورال است.

روش بررسی

در این مطالعه که به صورت مطالعه کنترل شده قبل و بعد انجام شده، ۱۴ زن با میانگین \pm انحراف معیار سن $۲۳\pm ۲/۱۸۴$ سال مبتلا به سندروم درد پتلوفمورال شرکت داشتند. میانگین \pm انحراف معیار قد و وزن شرکت‌کنندگان به ترتیب $۱۶۳/۴۳\pm ۵/۶۸$ سانتی‌متر و $۵۷/۲۹۷\pm ۵/۴۸۰$ کیلوگرم بود (جدول شماره ۱). روش نمونه‌گیری به صورت غیر احتمالی در دسترس از دانشجویان زن مبتلا به سندروم درد پتلوفمورال در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مراکز درمانی سطح شهر تهران انجام شد. پس از آنکه پزشک شرکت‌کنندگان را معاينة و ارزیابی کرد و فرم رضایت برای شرکت در مطالعه تکمیل شد، افرادی که معیارهای ورود را داشتند، در مطالعه شرکت کردند. سپس هدف کلی و روش مطالعه برای افراد شرح داده شد.

معیارهای انتخاب افراد در این مطالعه عبارت بود از: ابتلا به سندروم درد پتلوفمورال و پرونیشن بیش از حد مفصل سابتالار (بیشتر از ۹ درجه)، داشتن سن حداقل ۱۸ سال، نداشتن سابقه تروماتیک طی حداقل ۶ ماه گذشته، نداشتن دررفتگی یا جراحی در اندام تحتانی در ۶ ماه گذشته و نداشتن پاتولوژی در پا. همچنین معیار خروج از مطالعه شامل این نکات بود: ژنواروم و الگوم زانو، بدشکلی ساختاری مادرزادی، شکستگی در اندام تحتانی و مشکلات عصب‌شناختی نظیر فلچ مغزی، پولیو و اسپینوپلیو و رضایت‌نداشتن بیمار برای شرکت در مطالعه.

می‌آید. این علل عبارت است از: تروما، اختلالات مفصل زانو مانند اختلالات پتلا و فمور یا نداشتن تعادل عضلانی در سمت داخل و خارج مفصل زانو [۱]. شیوع این اختلال در بین بالغان جوان فعال ۷ درصد و در بین نیروهای نظامی بین ۱ تا ۱۵ درصد گزارش شده است [۲]. این سندروم ۵ درصد آسیب‌ها و ۲۵ درصد آسیب‌های زانو را شامل می‌شود [۴] و در زنان شایع‌تر از مردان و در افراد با وزن بالا و ورزشکاران شایع‌تر از افراد دیگر است [۵]. یکی از دلایل ایجاد سندروم درد پتلوفمورال، وجود پرونیشن بیش از حد در مفصل سابتالار است که باعث به وجود آمدن ایورژن طی رامرفتن و اختلال در توزیع طبیعی فشار کف پا می‌شود [۷، ۸].

در رامرفتن عادی و در ابتدای مرحله ایستایی قبل از برخورد پاشنه با زمین مفصل سابتالار به صورت طبیعی در حالت سوپینیشن قرار دارد و در مرحله تماس اولیه پا با زمین این مفصل به حالت پرونیشن می‌رود. هنگام تماس کامل پا با زمین، عملکرد مفصل سابتالار معکوس می‌شود و پا به سوپینیشن می‌رود. در موقعی مانند سندروم درد پتلوفمورال که مفصل سابتالار در پرونیشن بیش از حد قرار گرفته است، سیر طبیعی حرکت در مفاصل پا مختل می‌شود. در این شرایط پرونیشن مفصل سابتالار در مرحله میانی ایستایی ادامه می‌یابد و درنتیجه تیبیوپلیوپلیو در سمت خارج بچرخد و حرکت اکستنشن مفصل تیبیوپلیوپلیو در مرحله میانی ایستایی مختل می‌شود. بنابراین فمور به صورت جبرانی و با چرخش داخلی اکستنشن مفصل تیبیوپلیوپلیو را تسهیل می‌کند و در این هنگام کشک در شیار فمورال به سمت خارج جابه‌جا می‌شود [۹، ۱۱].

مطالعات نشان می‌دهد این عارضه به علت اختلال در راستای اندام تحتانی و فرسایش غضروف‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ابتلا به استئوارتریت باشد [۱۲-۱۵]. همچنین وجود پرونیشن بیش از حد و افزایش فشار در سمت داخل کف پا در این عارضه اختلالاتی طی رامرفتن به وجود می‌آورد. توزیع نامناسب فشار، اختلال و استرس زیادی ایجاد می‌کند و آسیب بافت و عضلات را به دنبال دارد [۱۶]. برای درمان این سندروم می‌توان از روش‌های جراحی و غیر جراحی استفاده کرد. روش‌های غیر جراحی شامل داروها و درمان توان بخشی است که فیزیوتراپی و کفی‌ها و ارتزهای زانو را دربرمی‌گیرد [۲۷].


استفاده از کفی یکی از روش‌های شناخته شده در راستای کاهش عوارض ناشی از این پاتولوژی است. یکی از شیوه‌های ساخت کفی استفاده از روش کفی با تکنیک «برداشت از بخش داخلی پاشنه»^۳ است. کری^۲ طی مطالعه‌ای استفاده از آن را برای بیماران مبتلا به سندروم درد پتلوفمورال پیشنهاد داده است. این شیوه می‌تواند با ایجاد تغییرات و اصلاحات در قالب مثبت سوپینیشن را به وجود آورد و ولگوس را در مفصل سابتالار

2. Medial Heel Skive

3. Kirby



توانبخنن



تصویر ۱. سیستم پدار.


ابزارهای اندازه‌گیری

به منظور تعیین میزان پرونیشن سابتالار و اندازه‌گیری زاویه بین خط میانی ساق پا و خط میانی کالکانئوس از گونیومتر استفاده شد. همچنین زاویه قوس طولی از طریق اتصال مرکز قوزک داخلی و توبرکل نویکولا ر و خط بین مرکز توبرکل نویکولا و سر اوین متابارس محاسبه شد [۹، ۱۹].

مورد مطالعه کفش همه شرکت‌کنندگان استاندارد و از یک مدل یکسان بود؛ به طوری که پنجه و فضای مناسب برای قرارگیری کفی را داشت.

در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات سطح کف پا از طریق نرم‌افزار پدار به هشت منطقه آناتومیکی (تصویر شماره ۲) تقسیم شد. این مناطق عبارت بود از: داخل پاشنه، خارج پاشنه، داخل ناحیه میانی پا، خارج ناحیه میانی پا، داخل جلوی پا (اولین مفصل متاتارسو فالنژیال)، ناحیه میانی جلو پا (دومین و سومین مفصل متاتارسو فالنژیال)، خارج جلوی پا (چهارمین و پنجمین مفصل متاتارسو فالنژیال) و انگشت شست [۸]. شاخص‌های ارزیابی شده شامل میانگین فشار کف پا (کیلوپاسکال) و سطح تماس (سانتی‌متر) بود.

برای ساخت کفی پای هر فرد به صورت جداگانه قالب‌گیری شد. ۵ تا ۷ روز پس از قالب‌گیری کفی‌ها آماده و آزمون مدنظر از هر فرد گرفته شد. در هنگام قالب‌گیری فرد در حالت نشسته و زانوها در حالت ۹۰ درجه فلکشن قرار داشت؛ به گونه‌ای که ساق پا کاملاً بر پا عمود بود و مفصل سابتالار در حالت نوتراخ قرار داشت. سپس اصلاحات روی قالب مثبت گچی انجام گرفت (تصویر شماره ۳). در این شیوه یک‌سوم مناطق را آناتومیکی جداگانه و اندازه‌گیری متغیرهای متعدد در این مناطق را دارد. نرم‌افزار توانایی تنظیم و درجه‌بندی حسگرهای ذخیره و انتقال می‌یابد [۲۰]. این دستگاه قابلیت تقسیم پا به مناطق اطلاعات متصل می‌شود که روی کمر فرد قرار گرفته است. این جعبه بلوتوث دارد و با فعال‌بودن آن اطلاعات به نرم‌افزار دستگاه انتقال می‌یابد [۲۰]. این دستگاه قابلیت تقسیم پا به مناطق را حسگرهای راه‌رفتن به صورت تک‌بعدی و سه‌بعدی دارد [۲۰].



توانبخنن

تصویر ۲. تقسیم‌بندی پا به هشت ناحیه.

برای ارزیابی میزان فشار کف پا از سیستم پدار با فرانس ۵۰۰ هرتز استفاده شد (تصویر شماره ۱). اعتبار و پایابی و دقیقت این دستگاه در مطالعات مشابه سنجیده شده است [۲۰-۲۳]. این دستگاه دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد. کفی‌های حسگردار با اندازه ۲۲ تا ۴۹ و با ۲ میلی‌متر ضخامت موجود است که هر کفی ۹۹ حسگر خازنی دارد و در ابعاد ۰/۳۹۱ × ۰/۳۹۱ سانتی‌متر حسگر قرار می‌گیرد. کفی‌های دارای حسگر درون کفش قرار می‌گیرد و به هریک از آن‌ها کابلی متصل می‌شود که این کابل‌ها با استرپ روی اندام تحتانی نگه داشته و به قسمت جعبه دریافت اطلاعات متصل می‌شود که روی کمر فرد قرار گرفته است. این جعبه بلوتوث دارد و با فعال‌بودن آن اطلاعات به نرم‌افزار دستگاه انتقال می‌یابد [۲۰]. این دستگاه قابلیت تقسیم پا به مناطق آناتومیکی جداگانه و اندازه‌گیری متغیرهای متعدد در این مناطق را دارد. نرم‌افزار توانایی تنظیم و درجه‌بندی حسگرهای ذخیره و انتقال اطلاعات از طریق بلوتوث به رایانه و نمایش فشارهای وارد بروی حسگرهای راه‌رفتن به صورت تک‌بعدی و سه‌بعدی دارد [۲۰].

پس از آشنایی شرکت‌کنندگان با آزمون، آزمون اصلی در دو مرحله راه‌رفتن با کفش و راه‌رفتن با کفش و کفی با شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه» انجام شد. هر مرحله آزمون شامل سه دور پیمودن مسیر مستقیم نه متری با سرعت معمولی بود و نتایج مطالعه از میانگین سه بار اجرای ارزیابی‌ها استخراج شد. مدت زمانی که هر فرد مسیر مدنظر را طی می‌کرد، با استفاده از کرنومتر ثبت شد. با توجه به مشخص‌بودن مسافت، سرعت هر فرد نیز ثبت شد. به منظور جلوگیری از اختلاف در شرایط افراد

کفی با ضخامت بالای چهارونیم میلی‌متر و برای افراد با وزن زیر ۷۰ کیلوگرم از ضخامت کمتر از چهارونیم میلی‌متری استفاده شود [۱۸، ۲۴]. با توجه به اینکه میانگین وزن افراد شرکت‌کننده در این مطالعه کمتر از ۷۰ کیلوگرم است، بنابراین برای ساخت کفی از ورق با ضخامت ۴ میلی‌متری استفاده شد (تصویر شماره ۴). کفی از نظر طول تا سرمتاتارس امتداد دارد و خطوط تریم آن زیر قوزک‌ها خاتمه می‌یابد [۱۰].

تحلیل آماری داده‌ها

تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با کمک نسخه ۲۰ نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. پس از بررسی طبیعی بودن داده‌ها توسط آزمون کولموگروف-سمیرنوف^۴، برای مقایسه مقادیر میانگین فشار کف پا و سطح تماس از آزمون آماری تی زوجی و مقایسه زوج‌ها استفاده شد. علاوه‌براین در تمامی آزمون‌ها سطح معنی‌داری ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

در این مطالعه ۱۴ زن مبتلا به سندروم درد پتلوفمورال شرکت کردند. مقادیر میانگین و انحراف‌معیار متغیرها شامل میانگین فشار کف پا و سطح تماس به‌طور جداگانه در جدول شماره ۲ آمده است. فرضیه تحقیق بر این بود که آیا استفاده از کفی با شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه» توزیع فشار کف پا را در افراد مبتلا به سندروم درد پتلوفمورال بهبود می‌بخشد یا خیر.

نتایج نشان داد کفی با شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه» فشار ناحیه داخل عقب پا را به‌طور معناداری کاهش و فشار قسمت داخل میانی پا را به‌طور معناداری افزایش داده است (۰/۰۵-P). با این حال در نواحی خارجی پاشنه، خارجی میان پا، داخلی جلو پا، میانی جلو پا، خارجی جلو پا و انگشت شست تفاوت معناداری مشاهده نشد.

همچنین کفی با شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه» در داخل ناحیه میانی و پاشنه پا به‌طور معنی‌داری سطح تماس را افزایش داده است؛ اما این میزان معنادار نیست. سطح تماس در نواحی دیگر در حالت بدون کفی و با استفاده از کفی تفاوت معناداری نداشت.

4. Kolmogorov-Smirnov



تصویر ۳. اصلاح کفی با شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه».



تصویر ۴. اصلاح کفی با شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه».

در پاشنه توسط کولیس و خط‌کش طی مرحله قالب‌گیری و اصلاح قالب به عنوان نشانه تعیین شد. سپس مرحله برداشتن و صاف کردن این نقطه با زاویه ۱۵ درجه آغاز و تا عمق چهار میلی‌متری دنبال شد. همچنین برای گرد کردن اطراف این ناحیه در راستای جلوگیری از ناراحتی بیمار توجه کافی و قوس طولی داخلی حمایت شد [۲۴، ۲۵].

پیشنهاد شده است برای افراد با وزن کمتر از ۷۰ کیلوگرم از

جدول ۱. میانگین و انحراف استاندارد نمودار آزمودنی‌ها در اطلاعات شخصی.

متغیرها	میانگین	انحراف‌معیار
سن (سال)	۲۳	۲/۱۸۴
وزن (کیلوگرم)	۵۷/۲۹۷	۵/۴۸
قد (سانتی‌متر)	۱۶۳/۲۳	۵/۶۸

جدول ۲. مقایسه میزان فشار و سطح تماس کف پا با و بدون استفاده از کفی ساخته شده با شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه».*

مناطق	بدون کفی	با کفی	اختلاف میانگین	سطح معنادار
داخل پاشنه	۱۴۸/۲۸۳±۲۴/۵۳	۱۳۰/۱۹۳±۲۱/۷۵	۱۸/۹±۰/۰۱*	۱/۸۰۹
	۱۵/۰۳±۱/۶۲	۱۵/۲۵±۰/۰۹۳	۰/۰۸	۰/۲۲
خارج پاشنه	۱۲۴/۷۵۶±۲۷/۷۷	۱۳۰/۱۹۳±۲۶/۵۴	۰/۱۰۴	۰/۴۳۷
	۱۹/۷۲۶±۲/۷۳	۱۹/۳۴±۲/۷۸	۰/۸	۰/۱۸
داخل ناحیه میانی با	۹/۰۱±۹/۲۳	۲۲/۹۳±۱۳/۱۵	۰/۰۰۳۰	۱/۳۹۲
	۵/۷۰۷±۴/۳۹	۱۲/۳۳۹±۵/۱۹	۰/۰۳۰	۰/۲۲۲
خارج ناحیه میانی با	۵۱/۳۰۹±۲۲/۸۸	۵۴/۰۳۴±۱۹/۸۱	۰/۴۱۸	۰/۷۷۵
	۱۸/۸۸۰±۵/۸۸	۲۰/۹۵±۶/۷۹	۱/۰۶	۲/۰۷
داخل جلوی پا	۱۱۷/۵۳±۴۱/۱۱	۱۲۰/۹۸±۴۴/۳۷	۰/۴۶۱	۳/۴۵
	۱۱/۲۳±۱/۴۳	۱۲/۴۹±۲/۴۵	۰/۲۲	۱/۲۶
میان جلوی پا	۱۳۶/۴۵±۲۵/۲۳	۱۴۰/۷۱±۲۵/۲۸	۰/۵۴۲	۴/۵۶۵
	۱۷/۰۷۵±۱/۳۴	۱۷/۶۸±۱/۴۴	۰/۱۶	۰/۶۰۵
خارج جلوی پا	۱۲۷/۷۰۲±۴۰/۱۳۰	۱۳۲/۷۳۳±۳۱/۷۰۲	۰/۴۸۶	۱۳
	۱۱/۳۳۸±۱/۱۵	۱۱/۸۵۲±۱/۱۹	۰/۱۱	۰/۵۱۴
انگشت شست	۲۰۹/۵۲±۴۱/۰۲	۲۱۸/۵۰۲±۴۰/۲۰	۰/۲۷۷	۸/۸۸۲
	۸/۵۱±۰/۷۶	۸/۶۰±۰/۹۴	۰/۶۹	۰/۰۹

توابختن

* مقدار به صورت میانگین خانحراف معیار گزارش شده است.

وی کاهش میزان فشار کف پایی در هنگام استفاده از کفی را در مقایسه با حالت عادی در افراد سالم گزارش کرده است [۲۶]. با وجود این دنیل (۲۰۱۲) برخلاف یافته این مطالعه بیان کرد کفی با شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه» به طور معناداری در افراد سالم سبب افزایش فشار کف پا در ناحیه داخل پاشنه می‌شود [۸].

نتایج این مطالعه نشان داد این کفی فشار سمت داخلی ناحیه میانی پا را افزایش داده است. این نتیجه با یافته حاصل از مک‌کورمیک (۲۰۱۳) درباره تأثیر ارتز سفارشی پا در مقایسه با

بحث

هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر کفی سفارشی ساخته شده با شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه» بر توزیع فشار کف پا در افراد مبتلا به سندروم درد پتلوفمورال بود. نتایج نشان داد توزیع فشار و سطح تماس ناحیه هشتگانه پا در دو حالت رامرقتن با کفش خالی و رامرقتن با کفی در برخی از نواحی پا متفاوت بود. براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر کفی مدنظر سبب کاهش فشار در سمت داخلی عقب پا شد. این نتیجه با نتیجه حاصل از مطالعه مک‌کورمیک (۲۰۱۳) همخوانی دارد.

نواحی ارزیابی شده فشار را به طور یکنواخت و متناسب منتقل کند؛ از این رو نمی‌توان قضاوت کرد که توزیع فشار را بهبود بخشیده است یا نه. براساس مطالعات تکمیلی و بلندمدت، استفاده از کفی ساخته شده بهشیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه» برای تعیین تأثیر آن لازم است.

محدودیت‌ها

مهم‌ترین محدودیت‌های مطالعه حاضر عبارت بود از: کمبودن تعداد نمونه، تعمیم‌ناپذیری نتایج مطالعه به بیماران دیگر به علت انجام روی زنان و کمبود مطالعات موجود درباره این نوع کفی و نیاز به آزمون آن.

پیشنهادها

با توجه به بررسی تأثیر آنی در این مطالعه پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

۱. پژوهشی صورت گیرد و در آن بیماران پس از مداخله بلندمدت از نظر فشار کف پایی بررسی شوند تا بتوان با قطعیت بیشتر درباره مؤثرهای کفی مدنظر اظهار نظر کرد؛

۲. تحقیق حاضر روی هر دو جنس (زن و مرد) با نمونه آماری بیشتری انجام شود؛

۳. در مطالعات آینده مقایسه کفی با شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه» با عمق چهار میلی‌متر با کفی‌های دیگر انجام گیرد.

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه بهرامیان در گروه ارتودوکسی فنی دانشگاه علوم بهزیستی و توابختنی تهران است. در پایان پژوهشگران مطالعه حاضر از تمامی دانشجویان و همکاران دانشگاه علوم بهزیستی و توابختنی تهران که در انجام این مطالعه شرکت و همکاری داشتند، تشکر و قدردانی می‌کنند.

کفشهای عادی مشابه بود. درنتیجه این کفی از طریق انتقال فشار از ناحیه داخلی پاشنه به قسمت داخلی ناحیه میانی پا فشار داخل پاشنه را کاهش داده است. با این حال در نواحی دیگر افزایش و انتقال فشار از ناحیه داخلی پاشنه معنی دار نبود. با توجه به اینکه کفی مدنظر گوه واروس و کاپ پاشنه دارد؛ بنابراین با قرارگیری بر بافت نرم پاشنه به خوبی نواحی استخوانی، بهویژه سمت داخل پاشنه، را پوشش و همچنین مفصل ساپتالار را در موقعیت بهتری در مقایسه با قبل قرار داده و باعث توزیع و جذب بهتر فشار در این ناحیه شده است.

با وجود اینکه پرونیشن بیش از حد همراه با سندروم درد پتلوفمورال باعث می‌شود که این بیماران توزیع بیشتر فشار کف پایی در قسمت داخل پاشنه را داشته باشند؛ اما کفی مدنظر توانست میانگین فشار قسمت داخلی پاشنه را کاهش دهد. حمایت از قوس طولی داخلی در این کفی فشارها را از ناحیه پاشنه به سمت ناحیه میانی پا منتقل می‌کند. همچنین این کفی در داخل ناحیه میانی پا نیز سطح تماس را به طور معنی‌داری افزایش داده است. مطالعه دنیل (۲۰۱۲) برخلاف این نتیجه تفاوت معنی‌داری را برای میزان سطح تماس در این ناحیه گزارش نکرده است. علاوه براین میزان سطح تماس در ناحیه داخل پاشنه افزایش یافته است که می‌تواند دلیلی بر کاهش میزان فشار وارد بر این ناحیه باشد. با این حال این افزایش سطح تماس معنادار نبود؛ در حالی که دنیل نیز طی مطالعه خود کاهش سطح تماس را در این ناحیه گزارش کرده که این میزان معنادار نبوده است.

اگرچه در مطالعات دیگر بهبود عالیم افراد مبتلا به سندروم درد پتلوفمورال با استفاده از کفی‌های دیگر مانند کفی‌های پیش‌ساخته به اثبات رسیده است؛ اما براساس دانش پژوهشگران مطالعه حاضر تاکنون مطالعه‌ای میزان فشار کف پا بررسی نکرده است. مطالعه حاضر کفی با شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه» میزان پرونیشن پا را حفظ کرده است. با وجود این با توجه به اینکه فقط نحوه توزیع فشار را از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر منتقل کرده و نتوانسته است در تمام نواحی ارزیابی شده فشار را به طور یکنواخت و متناسب منتقل کند؛ بنابراین نمی‌توان به درستی قضایت کرد که کفی مدنظر توزیع فشار را بهبود بخشیده است یا نه.

نتیجه‌گیری

هدف این مطالعه بررسی اثر کفی با شیوه «برداشت از بخش داخلی پاشنه» در افراد مبتلا به سندروم پتلوفمورال بود. به طور کلی مقایسه نتایج حاصل از راه‌رفتن بدون کفی و با کفی نشان داد کفی مدنظر به طور معناداری فشار را در ناحیه داخل پاشنه کاهش و در داخل ناحیه میانی پا افزایش داده و در سایر نواحی تاثیر معناداری نداشته است. بنابراین کفی مدنظر فقط نحوه توزیع فشار را از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر انتقال داده و نتوانسته است در تمام

References

- [1] Dixit S, Difiori JP, Burton M, Mines B. Management of patellofemoral pain syndrome. *American Family Physician*. 2007; 75(2):194-202.
- [2] Shwayhat AF, Linenger JM, Hofherr LK, Slymen DJ, Johnson CW. Profiles of exercise history and overuse injuries among United States Navy Sea, Air, and Land (SEAL) recruits. *American Journal of Sports Medicine*. 1994; 22(6):835-40. doi: 10.1177/036354659402200616
- [3] Baker MM, Juhn MS. Patellofemoral pain syndrome in the female athlete. *Clinics in Sports Medicine*. 2000; 19(2):315-29.
- [4] Nejati P, Forogh B, Moineeddin R, Baradaran H, Nejati M. Patellofemoral pain syndrome in Iranian female athletes. *Acta Medica Iranica*. 2010; 49(3):169-72.
- [5] Dugan SA. Sports-related knee injuries in female athletes: what gives? *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation*. 2005; 84(2):122-30. doi: 10.1097/01.phm.0000154183.40640.93
- [6] Peterson L, Renström P, Grana WA. Sports injuries: their prevention and treatment. Chicago: Year Book Medical Publishers; 1986.
- [7] Klingman RE, Liaos SM, Hardin KM. The effect of subtalar joint posting on patellar glide position in subjects with excessive rear-foot pronation. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*. 1997; 25(3):185-91. doi: 10.2519/jospt.1997.25.3.185
- [8] Bonanno DR, Zhang CY, Farrugia RC, Bull MG, Raspovic AM, Bird AR, et al. The effect of different depths of medial heel skive on plantar pressures. *Journal of Foot and Ankle Research*. 2012; 5(1):9. doi: 10.1186/1757-1146-5-s1-9
- [9] Tiberio D. The effect of excessive subtalar joint pronation on patellofemoral mechanics: a theoretical model. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*. 1987; 9(4):160-5. doi: 10.2519/jospt.1987.9.4.160
- [10] Aliberti S, Costa SX, Campos Passaro A, Arnone AC, Hirata R, Sacco IC. Influence of patellofemoral pain syndrome on plantar pressure in the foot rollover process during gait. *Clinics*. 2011; 66(3):367-72. doi: 10.1590/s1807-59322011000300001
- [11] Barton CJ, Bonanno D, Levinger P, Menz HB. Foot and ankle characteristics in patellofemoral pain syndrome: a case control and reliability study. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*. 2010; 40(5):286-96. doi: 10.2519/jospt.2010.3227
- [12] Berry PA, Teichtahl AJ, Wluka AE, Cicuttin FM. The role of biomechanical factors on patellofemoral osteoarthritis. *Current Rheumatology Reviews*. 2007; 3(2):123-7. doi: 10.2174/157339707780619368
- [13] Myer GD, Ford KR, Barber Foss KD, Goodman A, Ceasar A, Rauh MJ, et al. The incidence and potential pathomechanics of patellofemoral pain in female athletes. *Clinical Biomechanics*. 2010; 25(7):700-7. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2010.04.001
- [14] Thomas MJ, Wood L, Selfe J, Peat G. Anterior knee pain in younger adults as a precursor to subsequent patellofemoral osteoarthritis: a systematic review. *BMC musculoskeletal disorders*. 2010; 11:201. doi: 10.1186/1471-2474-11-201
- [15] Utting M, Davies G, Newman J. Is anterior knee pain a predisposing factor to patellofemoral osteoarthritis? *The Knee*. 2005; 12(5):362-5.
- [16] Safaei-Pour Z, Ebrahimi E, Saeedi H, Kamali M. [Investigation of dynamic plantar pressure distribution in healthy adults during standing and walking (Persian)]. *Archives of Rehabilitation*. 2009; 10(2):8-15.
- [17] Home P. Modification tips: making sure the shoe fits [Internet]. *Pediatry Today*. 2008; 15(8). Available from: <http://www.podiatrytoday.com/article/674>
- [18] Kirby KA. The medial heel skive technique. Improving pronation control in foot orthoses. *Journal of the American Podiatric Medical Association*. 1992; 82(4):177-88. doi: 10.7547/87507315-82-4-177
- [19] Johnston LB, Gross MT. Effects of foot orthoses on quality of life for individuals with patellofemoral pain syndrome. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*. 2004; 34(8):440-8. doi: 10.2519/jospt.2004.34.8.440
- [20] Ramanathan AK, Kiran P, Arnold GP, Wang W, Abboud RJ. Repeatability of the Pedar-X in-shoe pressure measuring system. *Foot and Ankle Surgery*. 2010; 16(2):70-3. doi: 10.1016/j.fas.2009.05.006
- [21] Partovifar M, Safaeipour Z, Vahab Kashani R, Zabili Yeganeh M, Bagherzadeh MS. [Immediate effect of foot insole with longitudinal medial arch support and metatarsal pad on plantar pressure distribution in females with rheumatoid arthritis (Persian)]. *Archives of Rehabilitation*. 2014; 15(3):72-8.
- [22] Farjad Pezhshk A, Sadeghi H, Farzadi M. [Comparison of plantar pressure distribution and vertical ground reaction force between dominant and non-dominant limb in healthy subjects using Principle Component Analysis (PCA) technique. (Persian)]. *Archives of Rehabilitation*. 2013; 14(1):91-102.
- [23] Boyd LA, Bontrager EL, Mulroy SJ, Perry J. The reliability and validity of the novel Pedar system of in-shoe pressure measurement during free ambulation. *Gait & Posture*. 1997; 5(2):165.
- [24] Kirby KA. Evolution of foot orthoses in sports. *Athletic footwear and orthoses in sports medicine*. New York: Springer; 2010.
- [25] Kirby KA. Subtalar joint axis location and rotational equilibrium theory of foot function. *Journal of the American Podiatric Medical Association*. 2001; 91(9):465-87. doi: 10.7547/87507315-91-9-465
- [26] McCormick CJ, Bonanno DR, Landorf KB. The effect of customised and sham foot orthoses on plantar pressures. *Journal of Foot & Ankle Research*. 2013; 6:19. doi: 10.1186/1757-1146-6-19
- [27] Miri Abyaneh H, Mosallanezhad Z, Mohammadizade H, Bakhshi E, Vahedi GH, Nourbakhsh MR. Physiotherapy with and without Superficial Dry Needling Affects Pain and Muscle Strength in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome. 2016; 14(1):23-30.